

VIH Entre Latinos



El VIH afecta desproporcionadamente a las comunidades latinas en los Estados Unidos. Más de 100,000 latinos con VIH en etapa 3 (SIDA) han muerto desde el inicio de la epidemia.


Los esfuerzos de prevención llevaron a disminuciones prometedoras del VIH entre los latinos. Sin embargo, el progreso se ha estancado en los últimos años, con el aumento de nuevas infecciones, especialmente entre los hombres homosexuales y bisexuales latinos.

Existe una necesidad urgente de ampliar el acceso a la prevención y el tratamiento del VIH para revertir esta tendencia, resaltando la importancia de la iniciativa federal "Acabemos con la epidemia del VIH: un plan para los Estados Unidos."

LOS FACTORES QUE IMPULSAN LA EPIDEMIA DEL VIH EN ESTA POBLACIÓN SON TAN DIVERSOS COMO LAS COMUNIDADES LATINAS.

UN QUINTO de las personas con VIH en los Estados Unidos son latinos.


PERSONAS CON INFECCIÓN POR VIH EN LOS EE.UU. POR RAZA / ETNIA, 2016



Conjunto de datos completo disponible [aquí](#)

UN CUARTO de las nuevas infecciones por VIH en los Estados Unidos ocurren entre latinos.


NUEVAS INFECCIONES POR VIH EN LOS EE.UU. POR RAZA / ETNIA, 2016



Conjunto de datos completo disponible [aquí](#)

DEL 2010 AL 2016, las nuevas infecciones por VIH entre los latinos se mantuvieron estables en aproximadamente 10,000 por año.

NUEVAS INFECCIONES POR VIH EN LOS ESTADOS UNIDOS, POR RAZA / ETNIA, 2010-2016



Conjunto de datos completo disponible [aquí](#)

RIESGO DE VIH EN LA VIDA

Si las tasas actuales persisten

- ▶ **1 EN 5**
Hombres latinos gays y bisexuales
- ▶ **1 EN 48**
Hombres latinos
- ▶ **1 EN 227**
Mujeres latinas


Pueden ser diagnosticados con VIH en su vida.



* Las estimaciones con un error estándar relativo (RSE por sus siglas en Inglés) de 30% a 50% están precedidas por un asterisco (*) y deben usarse con precaución porque no cumplen con el estándar de confiabilidad. No se presentan las estimaciones con un RSE de > 50%.

LOS HOMBRES LATINOS representaron el 90 por ciento de las nuevas infecciones por el VIH entre los latinos en 2016, y el 88 por ciento de ellas correspondió a hombres latinos homosexuales y bisexuales


NUEVAS INFECCIONES DE VIH EN LOS EE.UU. ENTRE LATINOS, POR GÉNERO, 2016



Conjunto de datos completo disponible [aquí](#)

LAS PERSONAS ENTRE 25 Y 34 AÑOS DE EDAD representaron el mayor número de nuevas infecciones entre latinos en 2016

NUEVAS INFECCIONES DE VIH EN LOS EE.UU. ENTRE LATINOS, POR GRUPO DE EDAD, 2010- 2016




Conjunto de datos completo disponible [aquí](#)

AVANCES Y DESAFÍOS EN LA PREVENCIÓN DEL VIH


No hay suficientes latinos con VIH conscientes de su estado, y muy pocos están recibiendo la atención médica y el tratamiento para el VIH que los ayudarán a vivir vidas más largas y sanas y a tener y mantener una carga viral indetectable, lo que significaría que no tendrían riesgo efectivo de transmitir el VIH.

RESULTADOS DE LA ATENCIÓN POR VIH PARA LATINOS, 2015



La profilaxis preexposición (o PrEP) es una píldora que las personas que no tienen VIH toman según lo indicado para prevenir el VIH. A pesar de los aumentos recientes en el uso de PrEP entre los latinos, siguen existiendo importantes brechas.

TOMA DE PREP POR RAZA / ETNIA, 2016



ESTIGMA

En algunas comunidades, el valor cultural del machismo puede crear resistencia a reconocer conductas sensibles pero arriesgadas, como el contacto sexual entre hombres o el uso indebido de sustancias.

El temor a revelar conductas de riesgo o la orientación sexual puede prevenir que las personas busquen realizarse pruebas del VIH, servicios de prevención y tratamiento, y el apoyo de amigos y familiares. Como resultado, es posible que algunos latinos carezcan de información fundamental sobre la prevención del VIH.

FACTORES SOCIALES Y ECONÓMICOS

Factores sociales y económicos como la pobreza, la discriminación racial, poco o falta de acceso a la atención médica pueden aumentar el riesgo de contraer el VIH.

Las barreras del idioma, el bajo nivel educativo y la desconfianza en el sistema de atención médica también pueden afectar la calidad de la atención y los servicios de prevención que reciben los latinos.

ALTA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ETS) Y TASAS MÁS ALTAS DE VIH

Las ETS pueden poner a las personas en mayor riesgo de contraer el VIH. Hay más enfermedades de transmisión sexual entre los latinos en comparación con los blancos, lo que puede contribuir al nivel desproporcionado de VIH en las comunidades latinas.

Las tasas desproporcionadas de VIH entre los latinos, así como la alta prevalencia del VIH en algunas comunidades donde residen latinos, también aumentan el riesgo de exposición al VIH.

FACTORES CULTURALES

Las investigaciones muestran que los latinos nacidos en diferentes países tienen distintos factores de riesgo de comportamiento para el VIH. Por ejemplo, los datos sugieren que los latinos nacidos en Puerto Rico son más propensos que otros latinos a contraer el VIH como resultado del uso de drogas inyectables o por contacto heterosexual de alto riesgo. En contraste, el contacto sexual con otros hombres es la causa principal del VIH entre los hombres latinos nacidos en lugares como México y los 50 estados de EE. UU.



Para obtener más información, visite www.cdc.gov/nchstp/newsroom