Thông Tin cho Cha Mẹ về Các Loại Thuốc Chích Ngừa cho Trẻ Em Trước Tuổi Thiếu Niên

Khi trẻ em lớn lên, mức độ miễn nhiễm do thuốc chích ngừa từ thuở nhỏ có thể không còn hiệu nghiệm. Trẻ em cũng có thể có nhiều nguy cơ nhiễm các căn bệnh hơn khi các em bước vào những năm trước tuổi thiếu niên. Vì các lý do này, mọi trẻ em trước tuổi thiếu niên đều nên chích các loại thuốc chích ngừa khác nhau vào thời kỳ khám sức khỏe hàng năm để ngăn ngừa các căn bệnh nghiêm trọng đôi khi ảnh hưởng đến tính mạng.

Các loại thuốc chích ngừa được đề nghị chích cho trẻ em ở tuổi 11 và 12

Mọi bé trai và bé gái trước tuổi thiếu niên đều nên chích:

- Thuốc chích ngừa **bệnh uốn ván, bạch hầu, và ho gà (Tdap)** nhằm ngăn ngừa những cơn ho gà, là nguyên nhân gây ra cơn ho nghiêm trọng kéo dài rất lâu. Bệnh ho gà rất dễ lan truyền. Loại bệnh này có thể làm cho trẻ em và người lớn bị đau ốm nghiêm trọng và có thể gây thiệt mạng cho em bé.

- Thuốc chích ngừa **bệnh nhiễm trùng màng não (MCV4)** ngăn ngừa việc lây nhiễm bệnh viêm màng não và nhiễm trùng máu. Căn bệnh này vô cùng nghiêm trọng và có thể gây ra việc cưa mất tay hay chân hay ngay cả gây thiệt mạng.

- **Thuốc chích ngừa bệnh cúm** có thể bảo vệ chống bệnh cúm, một loại nhiễm trùng mũi, họng và phổi gây ra bởi một loại vi-rút. Đa số người nhiễm bệnh cúm bị bệnh khoảng một tuần, sau đó cảm thấy khỏe hơn. Nhưng có một số người trở bệnh rất nặng và có thể dẫn đến tử vong.

Bé gái trước tuổi thiếu niên cũng nên chích:

- Thuốc chích ngừa vi-rút **human papillomavirus (HPV) hay chích ngừa ung thư cổ tử cung** nhằm bảo vệ chống lại các loại vi khuẩn HPV thông thường gây ra bệnh ung thư cổ tử cung cho phụ nữ. HPV là một loại vi-rút lây nhiễm qua đường tình dục. Lý tưởng nhất là cho các bé gái chích ngừa trước khi có quan hệ tình dục lần đầu tiên khi các em có thể có nguy cơ bị tiếp xúc với HPV.

DEPARTMENT OF HEALTH & HUMAN SERVICES · USA

CDC
SAFER · HEALTHIER · PEOPLE

Để biết thêm chi tiết về các loại thuốc chích ngừa dành cho trẻ em trước tuổi thiếu niên, xin hỏi bác sĩ của con quý vị, hay gọi số 800-232-4636 (chỉ nói tiếng Anh).
www.cdc.gov/vaccines/preteen/vit

Trẻ em từ 6 tháng đến 19 tuổi nên được chích ngừa cúm vào mỗi mùa thu hay mùa đông. Trẻ em trước tuổi thiếu niên nên chích các loại thuốc chích ngừa khác ở các lần khám sức khỏe ở tuổi 11 hay 12. Nếu con của quý vị chưa khám sức khỏe ở lứa tuổi này, hãy hỏi xin bác sĩ chích ngừa cho các em ngay bây giờ.

Thuốc chích ngừa cho trẻ em trước tuổi thiếu niên có hiệu quả và an toàn

- Các loại thuốc chích ngừa này đã được nghiên cứu rộng rãi và được công nhận là an toàn và có hiệu quả. Trẻ em trước tuổi thiếu niên có thể gặp phải phản ứng phụ nhẹ như tấy đỏ hoặc đau nhức ở chỗ chích thuốc (ngay cánh tay).
- Các loại thuốc chích ngừa này được cấp giấy phép bởi Cơ Quan Thực Phẩm và Dược Phẩm Liên Bang và được khuyến khích sử dụng bởi Viện Nhi Khoa Hoa Kỳ (American Academy for Pediatrics), Viện Y Khoa Gia Đình Hoa Kỳ và Cơ Quan Phòng Kiểm Bệnh Hoa Kỳ.

Quý vị có thể được giúp trả phí tổn chích ngừa

- Đối với các gia đình có bảo hiểm sức khỏe, toàn bộ hoặc phần lớn phí tổn chích ngừa đều được bảo hiểm đài thọ. Ngoài ra, ở Hoa Kỳ có một chương trình cung cấp chích ngừa miễn phí cho trẻ em không có bảo hiểm sức khoẻ. Để tìm hiểu về chương trình này, tham khảo với bác sĩ của con quý vị hay gọi cơ quan y tế Tiểu Bang.

Hãy hỏi thăm bác sĩ của con quý vị về các loại thuốc chích ngừa này ngay hôm nay!

Để biết thêm chi tiết về các loại thuốc chích ngừa dành cho trẻ em trước tuổi thiếu niên, xin hỏi bác sĩ của con quý vị, hay gọi số 800-232-4636 (chỉ nói tiếng Anh).
www.cdc.gov/vaccines/preteen/vit