

DETERIORO COGNITIVO SUBJETIVO ENTRE ADULTOS HISPANOS

Datos del Sistema de Vigilancia de Factores de Riesgo del Comportamiento (BRFSS) del 2015 al 2017, correspondientes a adultos hispanos en 49 estados*, Puerto Rico y el Distrito de Columbia: Personas de 45 años o más

1 de cada 9

adultos hispanos de 45 años o más tiene deterioro cognitivo subjetivo



El DETERIORO COGNITIVO SUBJETIVO consiste en PROBLEMAS DE LA MEMORIA autorreportados que han EMPEORADO a lo largo del último año.



El 53 % de las personas con deterioro cognitivo subjetivo tuvieron que abandonar sus actividades diarias

El 76 %

de las personas con deterioro cognitivo subjetivo tienen al menos una afección crónica



Casi una de cada dos

personas con deterioro cognitivo subjetivo dice que interfiere con sus actividades sociales, trabajo o tareas de voluntariado



Menos de la mitad

de las personas con deterioro cognitivo subjetivo han conversado sobre sus síntomas con un proveedor de atención médica



El 54 %

de las personas con deterioro cognitivo subjetivo necesitan ayuda para las tareas del hogar



* Todos, excepto Pensilvania



U.S. Department of Health and Human Services
Centers for Disease Control and Prevention

alzheimer's association®

cdc.gov/aging

CS 306075-D

July 2019