

DETERIORO COGNITIVO SUBJETIVO ENTRE VETERANOS

Datos del Sistema de Vigilancia de Factores de Riesgo del Comportamiento (BRFSS), del 2015 al 2018, correspondientes a veteranos* en los 50 estados, Puerto Rico y el Distrito de Columbia: Personas de 45 años o más

1 de cada 7



veteranos de 45 años o más tiene **Deterioro Cognitivo Subjetivo**

El **DETERIORO COGNITIVO SUBJETIVO** consiste en **PROBLEMAS DE LA MEMORIA** autorreportados que han **EMPEORADO** a lo largo del último año.

El **33 %** de los veteranos con deterioro cognitivo subjetivo tuvieron que abandonar sus actividades diarias



El **82 %** de los veteranos con deterioro cognitivo subjetivo tienen al menos una afección crónica

Uno de cada tres

veteranos con deterioro cognitivo subjetivo dice que interfiere con sus actividades sociales, trabajo o tareas de voluntariado



Menos de la mitad

de los veteranos con deterioro cognitivo subjetivo han conversado sobre sus síntomas con un proveedor de atención médica



El **28 %** de los veteranos con deterioro cognitivo subjetivo necesitan ayuda en las tareas del hogar



* Miembro activo de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, ya sea en una rama regular o en la Guardia Nacional o en una unidad de reserva



U.S. Department of Health and Human Services
Centers for Disease Control and Prevention

alzheimer's association®

cdc.gov/aging

CS 303070-B

octubre 2020