


DETERIORO COGNITIVO SUBJETIVO ENTRE ADULTOS EN ÁREAS RURALES

Datos del Sistema de Vigilancia de Factores de Riesgo del Comportamiento (BRFSS), del 2015 al 2018, correspondientes a adultos en áreas rurales en 42 estados y el Distrito de Columbia: Personas de 45 años o más

1 de cada 9

personas de 45 años o más tiene **Deterioro Cognitivo Subjetivo**



El **DETERIORO COGNITIVO SUBJETIVO** consiste en **PROBLEMAS DE LA MEMORIA** autorreportados que han **EMPEORADO** a lo largo del último año.

El **40%** de las personas con deterioro cognitivo subjetivo tuvieron que abandonar sus actividades diarias



El **85%** de las personas con deterioro cognitivo subjetivo tienen al menos una afección crónica

Una de cada tres

personas con deterioro cognitivo subjetivo dice que interfiere con sus actividades sociales, trabajo o tareas de voluntariado



Menos de la mitad

de las personas con deterioro cognitivo subjetivo han conversado sobre sus síntomas con un proveedor de atención médica



El 35%

de las personas con deterioro cognitivo subjetivo necesitan ayuda para hacer las tareas del hogar



U.S. Department of Health and Human Services
Centers for Disease Control and Prevention

alzheimer's association®

cdc.gov/aging

CS 317647-H

octubre 2020