

DETERIORO COGNITIVO SUBJETIVO

ENTRE ADULTOS INDOAMERICANOS Y NATIVOS DE ALASKA

Datos del Sistema de Vigilancia de Factores de Riesgo del Comportamiento (BRFSS), del 2015 al 2018, correspondientes a adultos indoamericanos y nativos de Alaska en los 50 estados, Puerto Rico y el Distrito de Columbia: Personas de 45 años o más

1 de cada 5 adultos indoamericanos y nativos de Alaska de 45 años o más tienen **Deterioro Cognitivo Subjetivo**



El DETERIORO COGNITIVO SUBJETIVO consiste en **PROBLEMAS DE LA MEMORIA** autorreportados que han **EMPEORADO** a lo largo del último año.

El 53 % de las personas con deterioro cognitivo subjetivo tuvieron que abandonar sus actividades diarias



El 87 % de las personas con deterioro cognitivo subjetivo tienen al menos una afección crónica

Una de cada dos

personas con deterioro cognitivo subjetivo dice que interfiere con sus actividades sociales, trabajo o tareas voluntarias



Casi el 60 % de las personas con deterioro cognitivo subjetivo han conversado sobre sus síntomas con un proveedor de atención médica

El 49 % de las personas con deterioro cognitivo subjetivo necesitan ayuda para las tareas del hogar



U.S. Department of Health and Human Services
Centers for Disease Control and Prevention



cdc.gov/aging

CS 303070-B

Juno 2020