

DETERIORO COGNITIVO SUBJETIVO ENTRE ADULTOS AFROAMERICANOS

Datos del Sistema de Vigilancia de Factores de Riesgo del Comportamiento (BRFSS), del 2015 al 2018, correspondientes a adultos afroamericanos en los 50 estados, Puerto Rico y el Distrito de Columbia: Personas de 45 años o más

1 de cada 8

adultos afroamericanos de 45 años o más tiene

Deterioro Cognitivo Subjetivo



El DETERIORO COGNITIVO SUBJETIVO consiste en PROBLEMAS DE LA MEMORIA autorreportados que han EMPEORADO a lo largo del último año.

El 54 % de las personas con deterioro cognitivo subjetivo tuvieron que abandonar sus actividades diarias



El 85 % de las personas con deterioro cognitivo subjetivo tienen al menos una afección crónica

Casi una de cada dos

personas con deterioro cognitivo subjetivo dice que interfiere con sus actividades sociales, trabajo o tareas de voluntariado



Menos de la mitad

de las personas con deterioro cognitivo subjetivo han conversado sobre sus síntomas con un proveedor de atención médica



El 47 %

de las personas con deterioro cognitivo subjetivo necesitan ayuda para las tareas del hogar



U.S. Department of Health and Human Services
Centers for Disease Control and Prevention

alzheimer's association®

cdc.gov/aging

CS 303070-B

Junio 2020