

DETERIORO COGNITIVO SUBJETIVO ENTRE ADULTOS HISPANOS

Datos del Sistema de Vigilancia de Factores de Riesgo del Comportamiento (BRFSS), del 2015 al 2018, correspondientes a adultos hispanos en los 50 estados, Puerto Rico y el Distrito de Columbia: Personas de 45 años o más

1 de cada 9

adultos hispanos de 45 años o más tiene

**Deterioro
Cognitivo
Subjetivo**



El DETERIORO COGNITIVO SUBJETIVO consiste en PROBLEMAS DE LA MEMORIA autorreportados que han EMPEORADO a lo largo del último año.

El 52 % de las personas con deterioro cognitivo subjetivo tuvieron que abandonar sus actividades diarias



El 75 % de las personas con deterioro cognitivo subjetivo tienen al menos una afección crónica

Una de cada dos personas con deterioro cognitivo subjetivo dice que interfiere con sus actividades sociales, trabajo o tareas de voluntariado



Menos de la mitad de las personas con deterioro cognitivo subjetivo han conversado sobre sus síntomas con un proveedor de atención médica

El 53 % de las personas con deterioro cognitivo subjetivo necesitan ayuda para las tareas del hogar



U.S. Department of
Health and Human Services
Centers for Disease
Control and Prevention

alzheimer's
association®

cdc.gov/aging

CS 303070-B

junio 2020