

DETERIORO COGNITIVO SUBJETIVO ENTRE HOMBRES

Datos del Sistema de Vigilancia de Factores de Riesgo del Comportamiento (BRFSS), del 2015 al 2018, correspondientes a hombres en los 50 estados, Puerto Rico y el Distrito de Columbia: Personas de 45 años o más

1 de cada 9 hombres de 45 años o más tiene **Deterioro Cognitivo Subjetivo**



El DETERIORO COGNITIVO SUBJETIVO consiste en **PROBLEMAS DE LA MEMORIA** autorreportados que han **EMPEORADO** a lo largo del último año.

El 36 % de los hombres con deterioro cognitivo subjetivo tuvieron que abandonar sus actividades diarias



El 76 % de los hombres con deterioro cognitivo subjetivo tienen al menos una afección crónica

Casi uno de cada tres

hombres con deterioro cognitivo subjetivo dice que interfiere con sus actividades sociales, trabajo o tareas de voluntariado



Menos de la mitad de los hombres con deterioro cognitivo subjetivo han conversado sobre sus síntomas con un proveedor de atención médica



El 30 % de los hombres con deterioro cognitivo subjetivo necesitan ayuda para las tareas del hogar



U.S. Department of Health and Human Services
Centers for Disease Control and Prevention

alzheimer's association®

cdc.gov/aging

CS 303070-B

junio 2020