

DETERIORO COGNITIVO SUBJETIVO ENTRE MUJERES

Datos del Sistema de Vigilancia de Factores de Riesgo del Comportamiento (BRFSS), del 2015 al 2018, correspondientes a mujeres en los 50 estados, Puerto Rico y el Distrito de Columbia: Personas de 45 años o más

1 de cada 9

mujeres de 45 años o más tiene **Deterioro Cognitivo Subjetivo**



El **DETERIORO COGNITIVO SUBJETIVO** consiste en **PROBLEMAS DE LA MEMORIA** autorreportados que han **EMPEORADO** a lo largo del último año.

El **43 %** de las mujeres con deterioro cognitivo subjetivo tuvieron que abandonar sus actividades diarias



El **83 %** de las mujeres con deterioro cognitivo subjetivo tienen al menos una afección crónica

Casi una de cada dos

mujeres con deterioro cognitivo subjetivo dice que interfiere con sus actividades sociales, trabajo o tareas de voluntariado



La mitad de las mujeres con deterioro cognitivo subjetivo han hablado sobre sus síntomas con un proveedor de atención médica

El **39 %** de las mujeres con deterioro cognitivo subjetivo necesitan ayuda para las tareas del hogar



U.S. Department of Health and Human Services
Centers for Disease Control and Prevention

alzheimer's association®

cdc.gov/aging

CS 303070-B

junio 2020