

¿Qué debe hacer con lo que sobre de la mezcla de doxiciclina y agua del primer tazón?

Bótela si su hijo pesa 51 libras o más (o si tiene 6 años o más). NO ha sobrado lo suficiente como para preparar otra dosis.

Guárdela si su hijo pesa 50 libras o menos (o si tiene 5 años o menos). Ha sobrado lo suficiente como para preparar otra dosis.

- **Guarde** la **mezcla de doxiciclina y agua** en un tazón o taza cubierta a temperatura ambiente (entre 68 y 77 °F o entre 20 y 25 °C) por hasta 24 horas.
- **Anote** la fecha, la hora y el contenido del recipiente en una etiqueta.
- **Guarde** la mezcla en un lugar seguro, fuera del alcance de niños o mascotas.
- **Bote** toda la mezcla no utilizada después de 24 horas y prepare una nueva mezcla de doxiciclina y agua para la siguiente dosis.



¿Qué debe saber acerca de los efectos secundarios?

- No tome doxiciclina si es alérgico a uno de los ingredientes del hiclato de doxiciclina o a los antibióticos tetraciclínicos.
- Busque ayuda de emergencia si tiene cualquier signo de reacción alérgica lo que incluye urticaria (ronchas), dificultad para respirar o hinchazón del rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- La doxiciclina puede causar diarrea, una reacción de la piel al sol, falta de apetito, náuseas y vómitos. Para obtener más información sobre los posibles efectos secundarios, consulte las instrucciones que aparecen en “Emergencia por ántrax: Cómo tomar doxiciclina para prevenir el ántrax”.
- Reporte toda reacción a la doxiciclina a MedWatch en www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.



En caso de emergencia: Cómo preparar hiclato de doxiciclina para niños y adultos que no puedan tragar pastillas

Durante una emergencia de salud pública, podría tener que preparar dosis de emergencia de doxiciclina para niños y adultos que no puedan tragar pastillas. Este folleto le muestra cómo mezclar las pastillas de 100 mg de hiclato de doxiciclina con alimentos o bebidas.

Siga las instrucciones que aparecen a continuación para preparar y darle a su hijo la **cantidad correcta** de medicamento **cada 12 horas** (una dosis por la mañana y otra por la noche), **todos los días**, durante el plazo indicado. Siga las mismas indicaciones para los adultos que no puedan tragar pastillas.

A Consiga los suministros que necesita.

Para preparar dosis de doxiciclina para niños y adultos que no puedan tragar pastillas, necesitará las siguientes cosas:

- 1 **pastilla** de hiclato de doxiciclina (100 mg)
- 1 cucharita de metal
- 1 jeringa oral o una cuchara para medicamentos (si tuviera una)
- 2 tazones pequeños
- Un poco de agua potable (4 cucharaditas o 20 mL)
- 1 de estos alimentos o bebidas para que el hiclato de doxiciclina molido tenga mejor sabor*:
 - leche, incluso leche materna o fórmula para bebés
 - leche chocolatada
 - pudín de chocolate
 - jugo de manzana mezclado con 2 a 4 cucharaditas de azúcar



*La doxiciclina tiene el mismo efecto si se toma con o sin alimentos o leche.

Para ver un [video complementario](#) con estas instrucciones, ingrese a www.cdc.gov/spanish y busque “instrucciones para moler la doxiciclina”.



B Remoje la pastilla en agua y muéla-la.



1. Coloque 1 pastilla de hiclato de doxiciclina en un tazón pequeño.
2. Agregue 4 cucharaditas (20 mL) de agua al mismo tazón.
3. Deje la pastilla **remojando** en el agua por al menos **10 minutos** para ablandarla.
4. **Muela** la pastilla con la parte de atrás de la cuchara de metal hasta que no pueda ver trozos en el agua.
5. Revuelva la pastilla molida y el agua para mezclarlos bien.



C Mida la cantidad correcta de doxiciclina.

1. **Busque el peso de su hijo** en el siguiente cuadro.

El peso es mejor, pero si no sabe cuánto pesa su hijo, busque la edad del niño en el cuadro.

2. Siga la línea del peso o la edad de su hijo hasta la columna que dice **“Cantidad de la mezcla de doxiciclina y agua para medir”**.

Peso	Edad	Cantidad de la mezcla de doxiciclina y agua para medir*
12 libras o menos	Menos de 1 mes	½ cucharadita (2.5 mL)
13 a 25 libras	1 a 11 meses	1 cucharadita (5 mL)
26 a 50 libras	1 a 5 años	2 cucharaditas (10 mL)
51 a 75 libras	6 a 8 años	3 cucharaditas (15 mL)
76 libras o más (dosis para adultos)	9 años o más	4 cucharaditas (20 mL)

*Dosis por peso según el cálculo derivado de la dosis de 2.2 mg/kg.

3. **Mida** la cantidad de la mezcla de doxiciclina y agua del primer tazón según el peso o la edad de su hijo.

Para una dosis de ½ cucharadita, llene la cucharita hasta la mitad o utilice una jeringa oral (si tuviera una). Es mejor administrar un poco más de medicamento que no dar lo suficiente.


4. Coloque esta cantidad en el **segundo tazón**.



Esta es **una dosis** que se debe mezclar con un alimento o bebida.

Para los niños que pesen 76 libras o más y para los adultos que no puedan tragar pastillas, **utilice toda** la mezcla de doxiciclina y agua del primer tazón (4 cucharaditas); el **contenido completo del primer tazón** es **una dosis** que se debe mezclar con un alimento o bebida.

D Mezcle la dosis con un alimento o bebida.



1. **Mezcle** la **dosis** (la cantidad medida de la mezcla de doxiciclina y agua) en el segundo tazón con **3 cucharaditas** de uno de los siguientes alimentos o bebidas:

- Leche, incluso leche materna o fórmula para bebés
- Leche chocolatada
- Pudín de chocolate
- Jugo de manzana mezclado con 2 a 4 cucharaditas de azúcar

Ahora tiene una dosis mezclada con alimento o bebida.

E Administre la dosis.

1. Dele a su hijo **toda** la mezcla de doxiciclina, agua y alimento del segundo tazón. Asegúrese de que trague toda la mezcla. Esta es una dosis.
2. Haga esto **cada 12 horas** (una vez por la mañana Y otra por la noche), **todos los días**, durante el plazo indicado.

