



ARME LAS PIEZAS PARA PREVENIR INFECCIONES EN PACIENTES DE DIÁLISIS

Involucre a los pacientes

Hable con sus pacientes y las personas encargadas de su cuidado sobre la higiene de manos y otras prácticas importantes de prevención de infecciones.

Disminuya el uso de catéteres

Identifique y resuelva las barreras para colocar fístulas o injertos y para quitar catéteres.

Practique higiene de manos y cambio de guantes

Sepa cuándo es necesario el lavarse las manos y el cambiarse sus guantes; ponga en práctica estos conocimientos.

Cuidado de catéteres y frote de tapones de rosca del catéter

Frote los tapones de rosca del catéter y déjelos secar al aire libre. Use clorhexidina con alcohol en la salida del catéter y aplique una pomada con antibiótico.

Vacune al personal de diálisis y a los pacientes

Asegúrese que el personal y los pacientes estén al día con las vacunas de influenza y hepatitis B y que los pacientes hayan recibido la vacuna antineumocócica.

Desinfecte la estación de diálisis

Asegúrese que la estación esté desocupada antes de desinfectarla. Cubra todas las superficies con desinfectante hasta que se vean bien mojadas.

Observe de cerca las tasas de infecciones

Conozca las tasas de infecciones importantes en su instalación, como las de infecciones del sitio de acceso y del torrente sanguíneo.

Siga prácticas de inyección seguras

Nunca use las agujas y jeringas más de una vez, ni administre medicamentos de un vial de dosis única o de una bolsa de líquidos intravenosos a más de un paciente. Cada vez que le sea posible use viales de dosis única y deséchelos inmediatamente después de su uso.

Utilice técnica aséptica

Tenga cuidado de no contaminar el sitio de acceso, las sondas, o el circuito de hemodiálisis. Frote los puertos de inyección antes de su uso.

