Control de infecciones de la tuberculosis en clínicas de atención del VIH y establecimientos de atención ambulatoria: un enfoque de equipo*

¡Cada persona cuenta!

Gerente de la clínica

- Apoye y financie un plan de control para la tuberculosis
- Designe a una persona que sirva como punto de contacto principal para el control de infecciones
- Asegúrese de que tanto los productos como los equipos estén disponibles y en buen estado
- Configure sus instalaciones para reducir la transmisión de la tuberculosis

Punto de contacto principal para el control de infecciones

- Haga un plan para el control de infecciones de la tuberculosis
- Asegúrese de que los consultorios y las salas de espera estén bien ventilados
- Capacite al personal de su establecimiento
- Mantenga un expediente de los proveedores de salud con tuberculosis
- Verifique que se respeten las políticas de control de infecciones todos los días

Recepcionista de admisiones

- A los pacientes que estén tosiendo deles pañuelos de tela, desechables o mascarillas para cubrir la nariz y la boca
- Pase a los pacientes que estén tosiendo a zonas de la sala de espera que estén separadas
- Dé prioridad a quienes parezcan tener tuberculosis para que sean vistos rápidamente por un proveedor de atención

Médicos y enfermeras

- Evalúe si los pacientes tienen síntomas de tuberculosis
- Evalúe y dé tratamiento a los pacientes lo antes posible
- Use respiradores (N-95/FFP2) cuando esté atendiendo a los pacientes con casos sospechosos o confirmados de tuberculosis (especialmente tuberculosis MDR o tuberculosis XDR**)
- Haga la recolección del esputo en una zona bien ventilada

Pacientes

- Cúbrase la boca y la nariz al toser o estornudar
- Bote los pañuelos usados en el recipiente para la basura
- Póngase una mascarilla si se lo pide el personal de la clínica
- Tome las medicinas para la tuberculosis de acuerdo a las instrucciones

Personal de laboratorio

- Implemente procedimientos de control de infecciones en el laboratorio
- Asegúrese de entregar los resultados a los médicos lo antes posible

El equipo entero

- Busque atención médica de inmediato si piensa que está infectado
- Hable sobre formas de mejorar los procedimientos de control de infecciones de tuberculosis en su clínica
- Piense constantemente en el control de infecciones de la tuberculosis

*Información tomada de "2009 WHO Policy on TB Infection Control in Health-Care Facilities, Congregate Settings, and Households".

**Tuberculosis multirresistente (MDR-TB) y tuberculosis extremadamente resistente (XDR-TB)

CS-248373-C
MLS-248069