

Le contrôle de l'infection TB dans les cliniques VIH et les centres de soins ambulatoires : une approche d'équipe*



Chaque personne compte!

Administrateur clinique



- Approuve et finance un plan écrit de contrôle de l'infection TB.
- Organise l'espace dans l'établissement de façon à réduire la transmission de la tuberculose.
- Nomme une personne responsable du contrôle de l'infection.
- S'assure que les meubles et l'équipement sont disponibles et entretenus.

Personne responsable du contrôle de l'infection



- Élabore un plan de contrôle de l'infection TB.
- Veille à ce que les salles d'examen et d'attente soient bien ventilées.
- Effectue la formation du personnel sur place.
- Tient un registre des professionnels de la santé qui contractent la tuberculose.
- Surveille de façon quotidienne les pratiques de contrôle des infections.

Agents d'accueil



- Fournit des mouchoirs en tissu ou en papier, ou des masques chirurgicaux aux patients qui toussent.
- S'assure que les patients qui toussent aient un espace d'attente séparé qui leur est propre.
- Donne la priorité aux cas de TB suspectés pour qu'ils puissent voir un clinicien rapidement.

Cliniciens et personnel infirmier



- Assurent le dépistage des symptômes de la tuberculose.
- Examinent et traitent les patients le plus tôt possible.
- Portent un appareil de protection respiratoire filtrant les particules (N-95/FFP2) quand ils s'occupent de patients atteints de tuberculose avérée ou présumée (en particulier MDR-TB ou XDR-TB **).
- Prélèvent des expectorations dans un endroit bien ventilé.

Patients



- Se couvrent la bouche et le nez en cas de toux.
- Jettent les mouchoirs usagés dans une poubelle.
- Portent un masque si le personnel clinique le demande.
- Se lavent les mains avec du savon et de l'eau en cas de toux.
- Prennent les médicaments TB comme indiqué.

Personnel de laboratoire



- Applique correctement les procédures de laboratoire de contrôle des infections.
- Veille à ce que les résultats soient envoyés rapidement aux cliniciens.

L'équipe dans son ensemble



- Cherchez à obtenir rapidement des soins si vous pensez que vous pouvez être infecté.
- Discutez des moyens d'améliorer les procédures de contrôle de l'infection TB dans votre clinique.
- Pensez contrôle de l'infection TB!

*Basé sur la Politique de l'OMS de 2009 pour la lutte contre la transmission de la tuberculose dans les établissements de santé, les structures collectives et les ménages.

** tuberculose multirésistante ou pharmacorésistante (MDR-TB) et tuberculose ultrarésistante (XDR-TB)

