


El VIH y los hispanos o latinos



De los **37 968 diagnósticos nuevos de infección por el VIH** en los EE. UU. y áreas dependientes* en el 2018, el 27 % fue entre hispanos o latinos.†


La mayoría de los diagnósticos nuevos en los hispanos o latinos fue entre hombres gays y bisexuales.




Del 2014 al 2018, la cantidad de diagnósticos de infección por el VIH se mantuvo estable entre los hispanos o latinos en general. Si bien las tendencias variaron para diferentes grupos de hispanos o latinos, la cantidad de diagnósticos de infección por el VIH declinaron en el caso de algunos grupos, incluidos los de mujeres hispanas o latinas y los de jóvenes hispanos o latinos de 13 a 24 años.



Tendencias por edad##



Tendencias por sexo



* Samoa Estadounidense, Guam, Islas Marianas del Norte, Puerto Rico, la República de Palaos y las Islas Vírgenes de los EE. UU.
 † Los hispanos o latinos pueden ser de cualquier raza.
 ‡ Según el sexo al nacer e incluye a las personas transgénero.
 ** Personas que contrajeron el VIH por transmisión perinatal, pero que en el momento del diagnóstico tenían 13 años o más.
 †† Incluye transfusión de sangre, hemofilia y factores de riesgo no reportados o no identificados.
 ‡‡ No incluye las categorías de transmisión *perinatal* ni de *otro* tipo.
 *** En los 50 estados y el Distrito de Columbia.



Los hispanos o latinos que no saben que tienen el VIH no pueden recibir el cuidado y tratamiento que necesitan para mantenerse sanos.




A fines del 2018, se estima que **1.2 MILLONES DE PERSONAS EN LOS ESTADOS UNIDOS** tenían el VIH.*** Entre esas personas, 274 100 eran hispanas o latinas.

5 de cada **6**
hispanos o latinos sabían que tenían el virus.




Es importante que los hispanos o latinos sepan si tienen el VIH para que puedan tomar medicamentos para tratarlo. Tomar medicamentos para el VIH todos los días puede hacer que la carga viral llegue a niveles indetectables. Las personas que consiguen y mantienen una carga viral indetectable (o mantienen la supresión viral) pueden vivir muchos años y de manera saludable. Tampoco tienen, efectivamente, el riesgo de transmitir el VIH a parejas sexuales VIH negativas.


En comparación con todas las personas infectadas por el VIH, las tasas de supresión viral son más bajas en los hispanos o latinos. Es necesario trabajar más para aumentar estas tasas. De cada **100 hispanos o latinos infectados con el VIH**:



61
recibieron algo de atención médica para el VIH



49
se mantuvieron bajo atención médica



53
habían logrado la supresión viral

Para comparar, de cada **100 personas en general** con el VIH, **65** recibieron algo de atención médica para el VIH, **50** se mantuvieron bajo atención médica y **56** habían logrado la supresión viral.

Hay varias dificultades que ponen a algunas personas hispanas o latinas en mayor riesgo de contraer el VIH.

Saber si se tiene el VIH



Las personas que no saben que están infectadas por el VIH no pueden recibir la atención médica que necesitan y podrían transmitir el VIH a otras personas sin saberlo.

Enfermedades de transmisión sexual (ETS)



Los hispanos o latinos tienen tasas más altas de algunas ETS. Tener otra ETS puede aumentar las probabilidades de contraer o transmitir el VIH.

Racismo, estigma del VIH y homofobia



El racismo, la estigma del VIH y la homofobia pueden afectar negativamente a muchos hispanos o latinos en cuanto a los comportamientos de riesgo adoptados, saber si tienen el VIH, la atención médica para el VIH, y otros servicios necesarios.

Acceso a los servicios de prevención y tratamiento del VIH



Algunos hispanos o latinos podrían tener mayor dificultad para conseguir servicios para el VIH debido a factores como estado migratorio, pobreza, patrones de migración, nivel de estudios más bajo y barreras de idioma.

¿De qué manera están los CDC cambiando las cosas para los hispanos o latinos?



Recolectan y analizan datos, y monitorean las tendencias del VIH.



Dan apoyo a las organizaciones comunitarias que aumentan el acceso a las pruebas de detección y la atención médica del VIH.



Realizan investigaciones sobre la prevención y brindan directrices para aquellos que trabajan en la prevención del VIH.



Promueven la realización de la prueba, así como la prevención y el tratamiento del VIH mediante la campaña *Detengamos Juntos el VIH*.



Apoyan a los departamentos de salud y las organizaciones comunitarias con fondos para el trabajo de prevención del VIH y les proporcionan asistencia técnica.



Fortalecen los programas de prevención del VIH exitosos y apoyan los esfuerzos nuevos, que se financian a través de la iniciativa *Ending the HIV Epidemic*.

Para obtener más información sobre los datos de vigilancia del VIH, lea la sección "Technical Notes" (Notas técnicas) de los informes de vigilancia del VIH en www.cdc.gov/hiv/library/reports/hiv-surveillance.html.

Para obtener más información, visite www.cdc.gov/hiv/spanish