


EL VIH y los hispanos o latinos



De los **36 801 diagnósticos nuevos de infección por el VIH** en los EE. UU. y áreas dependientes* en el 2019, el 29 % fue entre personas hispanas o latinas.†


Los hombres hispanos o latinos gais y bisexuales representaron la mayor cantidad de diagnósticos nuevos de infección por el VIH en el 2019.




Del 2015 al 2019, la cantidad de diagnósticos de infección por el VIH se mantuvo estable entre las personas hispanas o latinas en general. Si bien las tendencias variaron para diferentes grupos de personas hispanas o latinas, la cantidad de diagnósticos de infección por el VIH se redujeron en algunos grupos, incluidos los de mujeres hispanas o latinas y los de jóvenes hispanos o latinos de 13 a 24 años de edad.



Tendencias por edad**



Tendencias por sexo



* Guam, Islas Marianas del Norte, Islas Vírgenes de los EE. UU., Puerto Rico, República de Palaos y Samoa Estadounidense.
 † Las personas hispanas o latinas pueden ser de cualquier raza.
 ‡ Según el sexo asignado al nacer e incluye a las personas transgénero.
 ** Incluye exposición perinatal, transfusión de sangre, hemofilia y factores de riesgo no reportados o no identificados.
 †† No incluye las categorías de transmisión *perinatal* ni de *otro tipo*.
 †† En los 50 estados y el Distrito de Columbia.
 *** En 44 estados y el Distrito de Columbia.



Los hispanos o latinos que no saben que tienen el VIH no pueden recibir el cuidado y tratamiento que necesitan para mantenerse sanos.



En el 2019, una cantidad estimada de **1.2 millones de personas** tenía el VIH.# De esas personas, **294 200** eran hispanas o latinas.

De cada 100 personas con el VIH





De cada 100 personas hispanas o latinas con el VIH



Es importante que las personas hispanas o latinas sepan si tienen el VIH para que puedan tomar medicamentos para tratarlo en caso de tenerlo. Tomar medicamentos para el VIH todos los días puede hacer que la carga viral llegue a niveles indetectables. Las personas que logran y mantienen un nivel de carga viral indetectable (o mantienen la supresión viral) pueden mantenerse saludables durante muchos años y no tienen efectivamente ningún riesgo de transmitirles el virus a sus parejas sexuales.

En comparación con todas las personas con diagnóstico de infección por el VIH, las hispanas o latinas tienen aproximadamente las mismas tasas de supresión viral. De cada **100 personas hispanas o latinas con diagnóstico de infección por el VIH en el 2019*****



Para comparar, de cada **100 personas en general** con diagnóstico de infección por el VIH: **76** recibieron algo de atención médica para el VIH, **58** se mantuvieron bajo atención médica y **66** habían logrado la supresión viral.

Hay varias dificultades que ponen a algunas personas hispanas o latinas en mayor riesgo de contraer el VIH.

Saber si se tiene el VIH



Las personas que no saben que están infectadas por el VIH no pueden recibir la atención médica que necesitan y podrían transmitir el VIH a otras personas sin saberlo.

Enfermedades de transmisión sexual (ETS)



Los hispanos o latinos tienen tasas más altas de algunas ETS. Tener otra ETS puede aumentar las probabilidades de contraer o transmitir el VIH.

Racismo, estigma del VIH y homofobia



El racismo, la estigma del VIH y la homofobia pueden afectar negativamente a muchos hispanos o latinos en cuanto a los comportamientos de riesgo adoptados, saber si tienen el VIH, la atención médica para el VIH, y otros servicios necesarios.

Acceso a los servicios de prevención y tratamiento del VIH



Algunos hispanos o latinos podrían tener mayor dificultad para conseguir servicios para el VIH debido a factores como estado inmigratorio, pobreza, patrones de migración, nivel de estudios más bajo y barreras de idioma.

¿De qué manera están los CDC cambiando las cosas para los hispanos o latinos?



Recolectan y analizan datos, y monitorean las tendencias del VIH.



Dan apoyo a las organizaciones comunitarias que aumentan el acceso a las pruebas de detección y la atención médica del VIH.



Realizan investigaciones sobre la prevención y brindan directrices para aquellos que trabajan en la prevención del VIH



Promueven la realización de la prueba, así como la prevención y el tratamiento del VIH mediante la campaña *Detengamos Juntos el VIH*.



Apoyan a los departamentos de salud y las organizaciones comunitarias con fondos para el trabajo de prevención del VIH y les proporcionan asistencia técnica.



Fortalecen los programas de prevención del VIH exitosos y apoyan los esfuerzos nuevos, que se financian a través de la iniciativa *Ending the HIV Epidemic in the U.S.*

Para obtener más información sobre los datos de vigilancia del VIH, lea la sección "Technical Notes" (Notas técnicas) de los informes de vigilancia del VIH en www.cdc.gov/hiv/library/reports/hiv-surveillance.html.

Para ver los datos sobre los comportamientos de riesgo relacionados con el VIH y las barreras que dificultan la obtención de atención médica para el VIH, visite www.cdc.gov/hiv/spanish/group/racialethnic/hispaniclatinos.html.