

Hable con su proveedor de atención médica para determinar si la PrEP es lo adecuado para usted.

Si usted y su proveedor de atención médica están de acuerdo en que la PrEP podría reducir su riesgo de contraer el VIH, él o ella le hará pruebas para detectar la infección por el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual (ETS). También le hará pruebas para ver si los riñones le funcionan bien.

Si la PrEP es una buena opción para usted, su proveedor de atención médica le dará una receta.

Deberá visitar a su proveedor nuevamente:

- Cada 3 meses si está tomando los medicamentos de la PrEP, para repetir las pruebas de detección del VIH, surtir sus medicamentos y hacer seguimiento.
- Si mientras está tomando los medicamentos de la PrEP tiene algún síntoma que ha empeorado o no desaparece.
- Si no tiene un proveedor, visite prelocator.org para localizar a uno.

Dígale a su proveedor de atención médica si tiene dificultad para acordarse de tomar la pastilla o quiere dejar de tomar la PrEP.


La PrEP está cubierta por la mayoría de los programas de seguro y planes estatales de Medicaid. También es posible que reciba asistencia para pagar el copago por parte de los fabricantes del medicamento o de fundaciones de defensa de los pacientes.

El programa *Ready, Set, PrEP* provee la PrEP sin costo a aquellos que reúnen los requisitos. Obtenga más información en www.getyourPrEP.com.

Si no tiene seguro de salud, su proveedor de atención médica puede dirigirlo a programas de asistencia para los medicamentos que pueden ayudar con el pago de la PrEP.

Para obtener más información también puede comunicarse con su departamento de salud local y con organizaciones de servicios relacionados con el VIH/SIDA.

Visite prepost.org para obtener más información sobre los programas de asistencia para la PrEP.



La PrEP puede beneficiarlo si usted es VIH negativo y ALGUNA de las siguientes condiciones corresponde a su caso.

- Ha tenido relaciones sexuales anales o vaginales en los últimos 6 meses y, además:**
- tiene una pareja sexual con el VIH (especialmente si no se sabe su nivel de carga viral o si es detectable),
 - no ha usado condones con constancia, o
 - se le ha diagnosticado una ETS en los últimos 6 meses.
- Se inyecta drogas y, además:**
- se inyecta drogas con alguien que tiene el VIH, o
 - comparte las agujas, jeringas u otros implementos de inyección de drogas (por ejemplo, las cocinas).
- Le han recetado la PEP (profilaxis posexposición) y, además:**
- indica tener un comportamiento continuo de riesgo, o
 - ha usado la PEP múltiples veces.

Si tiene una pareja con el VIH y está considerando quedar embarazada, hable con su proveedor de atención médica acerca de la PrEP si todavía no la está tomando.



2

¿Qué es la PrEP?

La PrEP, o profilaxis preexposición, son medicamentos que pueden reducir sus probabilidades de contraer el VIH.

- La PrEP puede impedir que el VIH se establezca y se propague por todo el cuerpo.
- Si los medicamentos de la PrEP se toman según las indicaciones, son altamente eficaces para prevenir que contraiga el VIH a través de las relaciones sexuales o el consumo de drogas inyectables.
- La PrEP es mucho menos eficaz cuando no se toma según las indicaciones.

Recuerde, la PrEP lo protege contra el VIH, pero no contra otras enfermedades de transmisión sexual (ETS) o infecciones.



1

PrEP

¿Es usted VIH negativo, pero está en riesgo de contraer el VIH? La PrEP puede mantenerlo libre del VIH.



Para obtener más información sobre la PrEP visite [cdc.gov/hiv/prep](https://www.cdc.gov/hiv/prep) y para información general sobre el VIH llame al **1-800-CDC-INFO (232-4636)**. Para localizar a un proveedor de PrEP cercano visite [prelocator.org](https://www.prelocator.org).