

El VIH en los Estados Unidos y áreas dependientes


DE LOS 37 968 DIAGNÓSTICOS NUEVOS DE INFECCIÓN POR EL VIH EN LOS EE. UU. Y ÁREAS DEPENDIENTES* EN EL 2018:

69 % FUERON ENTRE HOMBRES GAIS Y BISEXUALES^{†‡}

24 % FUERON ENTRE PERSONAS HETEROSEXUALES^{}**

7 % FUERON ENTRE PERSONAS QUE SE INYECTAN DROGAS (PWID)^{††}

Diagnósticos nuevos de infección por el VIH en los EE. UU. y áreas dependientes en las subpoblaciones más afectadas, 2018



Entre el 2014 y el 2018, la cantidad de diagnósticos de infección por el VIH bajó un 7 % en general. Pero las tendencias variaron en distintos grupos de personas:

Hombres gais y bisexuales: [†] bajó un 7 %

Personas heterosexuales: ^{} bajó un 10 %**

Personas que se inyectan drogas: ^{††} subió un 9 %

* Samoa Estadounidense, Guam, Islas Marianas del Norte, Puerto Rico, la República de Palaos y las Islas Vírgenes de los EE. UU.
[†] Incluye las infecciones atribuidas al contacto sexual entre hombres y consumo de drogas inyectables (hombres que indicaron tener ambos factores de riesgo).
[‡] En esta hoja informativa se usa el término *hombres gais y bisexuales* para representar a los hombres gais y bisexuales y a otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres.
^{**} No incluye a las personas heterosexuales que indicaron consumir drogas inyectables.
^{††} No incluye las infecciones atribuidas al contacto sexual entre hombres y consumo de drogas inyectables (hombres que indicaron tener ambos factores de riesgo).
^{‡‡} *De raza negra* se refiere a las personas que tienen sus orígenes en alguno de los grupos raciales negros de África, incluidos los inmigrantes del Caribe, Sudamérica y América Latina. *Afroamericano/a* es un término que a menudo se usa para referirse a los estadounidenses de ascendencia africana que tienen ancestros en América del Norte. Las personas podrían identificarse con uno de los términos, con ambos o elegir una identidad totalmente diferente.
^{***} Los hispanos o latinos pueden ser de cualquier raza.
^{†††} En los 50 estados y el Distrito de Columbia.



Aproximadamente 1.2 millones de personas en los EE. UU. tienen el VIH.^{†††} Las personas que tienen el VIH necesitan saberlo para que puedan tomar los medicamentos y tratar esta infección. Tomar los medicamentos para el VIH según lo indicado puede reducir la cantidad de virus en el cuerpo a niveles muy bajos (lo cual se llama supresión viral) o incluso a niveles indetectables.

A FINES DEL 2018, UNA CANTIDAD ESTIMADA DE

1 173 900

PERSONAS TENÍA EL VIH.^{†††}

6 DE CADA 7
SABÍAN QUE TENÍAN EL VIRUS.

De cada 100 personas con el VIH en el 2018:^{†††}



recibió algo de atención médica para el VIH




se mantuvieron bajo atención médica



habían logrado la supresión viral

Las personas con la infección por el VIH que toman los medicamentos según las indicaciones, y que logran y mantienen la supresión viral o niveles de carga viral indetectables, pueden mantenerse sanas, y no tienen efectivamente ningún riesgo de transmitirles sexualmente el virus a sus parejas VIH negativas.

Diagnósticos nuevos de infección por el VIH en los EE. UU. y áreas dependientes por edad, 2018



Reduzca su riesgo al



No tenga relaciones sexuales



Use condones



No comparta jeringas



Tome medicamentos para prevenir o tratar el VIH



EL VIH ES UN VIRUS QUE ATACA AL SISTEMA INMUNITARIO DEL CUERPO.

Generalmente se transmite mediante las relaciones sexuales anales o vaginales, o al compartir jeringas con una persona que tiene el VIH. La única manera de saber que tiene el VIH es haciéndose la prueba. Todas las personas de 13 a 64 años deberían hacerse la prueba al menos una vez, y aquellas en alto riesgo deberían hacérsela al menos una vez al año. Pregúntele a su médico o visite gettested.cdc.gov/es para encontrar un lugar donde hagan las pruebas. Sin tratamiento, el VIH puede hacer que una persona esté muy enferma o puede incluso causarle la muerte. Si usted tiene el VIH, comience el tratamiento lo antes posible para mantenerse sano y ayudar a proteger a sus parejas.

Para obtener más información

Llame al 1-800-CDC-INFO (232-4636)
Visite www.cdc.gov/hiv/spanish