


POLIO SPREADS EASILY

پوليو به آسانی انتشار پیدا می کند
پوليو په آسانی سره خپریږي



Sore throat | گلو درد | ږوخ غنوتس د



Fever | تب | تبه




Tiredness | ماندگی | ستړیا



Nausea | دلبدی | زړه بدبڼه



Headache | سردرد | د سر درد



Stomach pain | دلدرد | د معدې درد

If You Have Polio Symptoms Immediately Report Your Symptoms to Medical Staff

اگر اعراض و علائم پوليو را در خود می بینید
فوراً اعراض و علائم خود را به کارکنان صحی راپور بدهید

که تاسو د پوليو نښې لرئ
سمدستي خپلې نښې طبي کارمندانو ته راپور کړئ

Most people who get infected with poliovirus (about 72%) **will not have any visible symptoms.**

People with symptoms will have:

- Sore throat
- Fever
- Tiredness
- Nausea
- Headache
- Stomach pain

These symptoms usually last 2 to 5 days.

اکثر کسانى که به پوليو ویروس (حدود 72%) مبتلا می شوند هیچ نوع علائم مشهودی ندارند.

اشخاص مبتلا به این ویروس، علائم ذیل را در خود مشاهده می کنند:

- گلو درد
- تب
- ماندگی
- دلبدی
- سردرد
- دلدرد

این علائم معمولاً به مدت 2 الی 5 روز دوام پیدا می کنند.

ډیر خلک چې په پوليو ویروس اخته کیږي (شاوخوا 72%) به هیڅ ښکاره نښې ونلري.

خلک نښو سره به ولري:

- د ستونى خور
- تبه
- ستړیا
- زړه بدبڼه
- د سر درد
- د معدې درد

دا نښې معمولاً له 2 څخه تر 5 ورځو پورې دوام کوي.

Get the polio vaccine if it is offered by medical staff.

اگر واکسين پوليو توسط پرسونل صحی پیشنهاد می شود، آن را دریافت کنید.

د پوليو واکسين ترلاسه کړئ که دا د طبي کارمندانو لخوا وړاندیز وړاندیز کیږي.

