


इन्फ्लुएन्जा (फ्लू) तपाईंको बच्चालाई फ्लू लाग्यो भने

तपाईंको बच्चा फ्लूले बिरामी भएमा के गर्ने


५ वर्षमुनिका केटाकेटीमा फ्लूको समस्या हुने बढी सम्भावना हुन्छ । दम र मधुमेह जस्ता दीर्घ-रोग भएका केटाकेटीहरूलाई फ्लू लागेमा यसले गम्भीर समस्या उत्पन्न गर्न सक्छ ।

तपाईंको बच्चा ५ वर्षभन्दा मुनिको वा अरु कुनै पनि उमेरको छ र दीर्घ रोग (जस्तै दम वा मधुमेह) लागेको छ, र उसमा फ्लूको लक्षण देखिन्छ भने, ऊ फ्लूको गम्भीर जटिलताले जोखिमपूर्ण स्थितिमा भएको बुझ्नुपर्छ ।

तपाईंको बच्चालाई जाँच्नुपर्ने वा नपर्ने कुरा डाक्टरलाई सोध्नुहोस् ।




धेरैजसो केटाकेटीहरू डाक्टरकहाँ नगईकन निको हुन्छन् । अरु केटाकेटीलाई फ्लूले अभि बढी बिरामी बनाउन सक्छ । कुनै पनि उमेरको बच्चामा फ्लूको गम्भीर लक्षण देखिएमा डाक्टरकहाँ गैहाल्नुपर्छ ।




एन्टिभाइरल औषधिहरूले बिरामी भएको पहिलो २ दिनभित्र (४८ घण्टा) सेवन गर्न शुरु गरेमा राम्रो काम गर्छन् ।

डाक्टरले तपाईंको बच्चामा फ्लूको लक्षण शुरु भएको ४८ घण्टा पछि पनि एन्टिभाइरल औषधि शुरु गराउन सक्छ, खासगरी तपाईंको बच्चा अस्पतालमा छ भने अथवा फ्लूको कारणले गम्भीर अवस्था सिर्जना हुने परिस्थिति देखिएको छ भने ।




इन्फ्लुएन्जा (फ्लू) तपाईंको बच्चालाई फ्लू लाग्यो भने


जरो १०० डिग्री फारेनहाइटभन्दा माथि वा बराबरीको तापक्रम हो (३७.८ डिग्री सेल्सियस) । यदि तपाईंसँग थर्मामीटर छैन भने, बच्चाको अनुहार छामेर हेर्नुहोस् । तपाईंको बच्चा सामान्यभन्दा तातो छ भने, रातो देखिन्छ भने, पसिना आएको छ भने, अथवा काम्दै छ भने, तपाईंको बच्चालाई जरो आएको हुनसक्छ ।



तपाईंको बच्चालाई जरो आएको छ भने जरो घटाउने औषधि पाइन्छन् । औषधि पसलमा ती औषधिहरू (पुर्जी बिना) पाइन्छन् र तपाईं तिनलाई सजिलै किन्न सक्नुहुन्छ । अरूलाई डाक्टरको पुर्जी चाहिन्छ । तपाईंको डाक्टरले बच्चाको उमेर अनुसार कुन औषधि लेखिदिन्छन् त्यसबारेमा विश्वस्त हुनुहोस् र सल्लाह गर्नुहोस् ।




पसलमा (पुर्जी बिना) बेचिने केही औषधिहरू बच्चाका लागि सिफारिस गरिएका र बच्चालाई आराम पुऱ्याउने खालका हुन्छन् । ती औषधि उपयुक्त छन् कि छैनन् भनेर जाँचन तपाईंले डाक्टरलाई फोन गरेर सोध्नुपर्छ । फ्लू लागेको बच्चालाई कहिल्यै एस्पिरिन दिनुहुँदैन भन्ने कुरा राम्ररी बुझ्नुहोस् ।




इन्फ्लुएन्जा (फ्लू) तपाईंको बच्चालाई फ्लू लाग्यो भने


फ्लूको संक्रमण रोक्न, आफ्नो बिरामी बच्चालाई उपचार गर्न लाँदा बाहेक जरो निको भएपछिको कमसेकम २४ घण्टासम्म घरैमा राख्नुहोस् ।



केटाकेटीहरू जरो निको भएको २४ घण्टापछि विद्यालय जान सक्छन् तर तिनले जरो घटाउने औषधि खाइरहेको हुनुहुँदैन ।




तपाईंको बच्चा बिरामी भएको बेला, उसले पर्याप्त आराम पाएको छ र भोल पदार्थ खाएको छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुनुहोस् (जस्तै पानी, रस, अन्य पेय पदार्थ, शिशुका लागि एलेक्ट्रोलाइट पेय पदार्थ, पडियालाइट®) उसको शरीरलाई चाहिने जति भोलिलो पदार्थ पाएको कुरामा ढुक्क हुनुहोस् ।




इन्फ्लुएन्जा (फ्लू) तपाईंको बच्चालाई फ्लू लाग्यो भने

घरका अन्य सदस्यमा फ्लू सर्न नदिन गर्नुपर्ने कुराहरू :


घरका अन्य स्वस्थ सदस्यसँग कमसेकम सम्पर्कमा आओस् भन्नका लागि तपाईंको बिरामी बच्चालाई अलग्गै कोठामा राख्नुहोस् ।



तपाईंको बच्चालाई खाने वा पिउने कुरा अरुसँग बाँडेर खान वा पिउन नदिनुहोस् ।



बिरामी बच्चाको हेरविचार गर्न एक जना छुट्टै व्यक्तिको व्यवस्था गर्ने काशिस गर्नुहोस् । सम्भव भएसम्म त्यो हेरविचार गर्ने व्यक्ति गम्भीर फ्लू लाग्न सक्ने धेरै जोखिम नभएको भएमा राम्रो हुनेछ, जस्तै गर्भवती नभएकी महिला, अथवा दम जस्ता रोग नलागेका मानिस ।



थप जानकारीको लागि सीडीसी (CDC) जानकारी केन्द्रमा 1-800-CDC-INFO (232-4636) नं. मा फोन गर्नुहोस् वा www.cdc.gov/flu वेबसाइटमा जानुहोस् ।