

Medicamentos para a prevenção da malária durante viagens

Primaquina

O que é a primaquina?

A primaquina (também conhecida como fosfato de primaquina) é um medicamento antimalária disponível nos Estados Unidos para venda somente com prescrição médica. Ela está disponível em comprimidos contendo 15 mg de base (26,3 mg de sal).

Você precisa estar ciente de que o comprimido contendo 15 mg de base é o mesmo que o comprimido contendo 26,3 mg de sal. Trata-se apenas de duas maneiras diferentes de descrever a mesma coisa.

A primaquina têm três usos distintos. Ela pode ser prescrita sozinha para a prevenção da malária durante viagens curtas em regiões nas quais principalmente um certo tipo de malária (*P. vivax*) ocorre (veja o mapa abaixo). Ela pode ser prescrita após o retorno de uma viagem de longa duração em combinação com um segundo medicamento para prevenção da malária. Por fim, ela pode ser prescrita como parte de uma combinação com outro medicamento para o tratamento da malária.

Este folheto informativo oferece informações sobre o seu uso na prevenção da infecção com malária associada tanto a viagens curtas quanto longas.

Quem pode tomar a primaquina?

A primaquina pode ser prescrita à maioria dos adultos e crianças de todas as idades.

Quem não deve tomar a primaquina?

Mulheres grávidas e pessoas com deficiência de glicose-6-fosfato desidrogenase (ou G6PD) não devem tomar primaquina.

A deficiência de G6PD é um distúrbio genético que algumas pessoas podem não saber que tenham. As pessoas com esse distúrbio não devem tomar primaquina porque ela pode fazê-las adoecer e causar a morte em alguns casos. Um simples exame de sangue deve ser feito antes de você usar este medicamento pela primeira vez para garantir que você não tem esse distúrbio. Mulheres que estiverem amamentando também deverão testar seus bebês para se certificar de que eles não tenham o distúrbio antes da mãe tomar primaquina.

Como devo tomar a primaquina?

Ao tomar primaquina para a prevenção da malária durante uma viagem curta, tanto adultos quanto crianças devem tomar uma dose por dia começando um dia ou dois antes da viagem para a região na qual a transmissão da malária ocorre. Eles devem tomar uma dose por dia enquanto estiverem na região e por sete dias consecutivos após deixá-la.

Ao tomar a primaquina após retornar de uma viagem de longa duração em combinação com outro medicamento de prevenção antimalária, tanto adultos quanto crianças devem tomar uma dose por dia por 14 dias.

A dosagem diária para adultos é de 30 mg de base por dia. Observe que isso significa dois comprimidos por dia.

O seu médico calculará a dosagem diária correta para o seu filho com base no peso dele. A dose infantil não deve ultrapassar a dose adulta de 30 mg de base por dia.


Sempre tome a primaquina com o estômago cheio.

Em quais partes do mundo a primaquina pode ser usada por viajantes na prevenção da malária?

Atualmente a primaquina é recomendada como um dos medicamentos antimalária que podem ser usados em viagens curtas para partes de doze países: Argentina, Belize, Bolívia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá e Paraguai.

A primaquina pode ser usada após o retorno de viagens longas para a maioria dos outros países do mundo nos quais ocorre transmissão da malária.

O CDC acompanha todos os lugares do mundo nos quais a transmissão da malária ocorre e quais medicamentos contra a malária são recomendados em cada lugar. Essas informações podem ser encontradas usando o mapa da malária no website do CDC: <http://www.cdc.gov/malaria/map/index.html>.



Primaquina

A malária é uma doença grave que pode causar a morte se não tratada imediatamente. Ela é causada por um parasita que pode infectar um certo tipo de mosquito que se alimenta em humanos.

Cerca de 1.700 casos de malária são diagnosticados nos Estados Unidos a cada ano, quase todos em pessoas que viajam para partes do mundo nas quais a malária ocorre.

Onde posso comprar a primaquina?

Medicamentos antimalária estão disponíveis nos Estados Unidos somente com prescrição médica. Os medicamentos devem ser obtidos em uma farmácia antes da viagem em vez de no país de destino. A compra de medicamentos no exterior tem seus riscos. Eles podem ser de má qualidade, estar contaminados ou ser falsos e não oferecer proteção contra a malária.

A primaquina pode interagir com meus outros medicamentos?

Alguns outros medicamentos podem interagir com a primaquina e causar problemas. O seu médico é responsável por avaliar os outros medicamentos que você esteja tomando para garantir que não haja interações entre eles e a primaquina. Em alguns casos, os medicamentos podem ser ajustados para minimizar essa interação. Você também pode pedir ao seu farmacêutico para verificar as interações medicamentosas.

Quais são os efeitos colaterais potenciais da primaquina?

Os efeitos colaterais mais comuns da primaquina são náusea e dor de estômago. Esses efeitos colaterais podem ser reduzidos ingerindo-se a primaquina com alimentos.

Pessoas com o distúrbio genético chamado deficiência de G6PD podem experimentar icterícia intensa, escurecimento da urina e baixas contagens de células sanguíneas, motivo pelo qual elas não devem tomar este medicamento.

Todos os medicamentos podem acarretar alguns efeitos colaterais. Efeitos colaterais menores tais como náusea, vômito ocasional ou diarreia em geral não exigem suspensão do medicamento antimalária. Caso você não consiga tolerar o seu medicamento, consulte o seu profissional de saúde. Outros medicamento antimalária estão disponíveis.

Outras considerações

- Boa para viajantes de última hora que sabem que não sofrem de deficiência de G6PD, já que a administração do medicamento é iniciada um a dois dias antes da viagem para a região onde a malária ocorre.
- A superdosagem com medicamentos antimalária, incluindo a primaquina, pode ser fatal. A medicação deve ser armazenada em recipientes que não possam ser abertos por crianças e fora do alcance de bebês e crianças.

Por quanto tempo é seguro usar a primaquina?

O CDC não determinou limites para o uso da primaquina na prevenção da malária. Não há evidências de danos quando o medicamento é usado por longos períodos.



Para obter mais informações:

Visite o do CDC sobre a malária em www.cdc.gov/malaria

Profissionais de saúde que precisarem de ajuda para diagnosticar ou manejar casos com suspeita de malária devem ligar para a linha direta do CDC sobre malária: 770-488-7788 ou 855-856-4713 (ligação gratuita) (segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, horário do leste dos EUA).

Para consultas após o horário comercial, ligue para: 770-488-7100 e peça para falar com um médico do CDC da área de malária.

Previna-se contra a malária

- Tome um medicamento antimalárico.
- Evite picadas de mosquitos.
- Caso adoença, busque assistência médica imediatamente.