

EL SARAMPIÓN

NO ES SIMPLEMENTE UN SARPULLIDO LEVE



El sarampión puede ser peligroso, especialmente para los bebés y los niños pequeños.

Los síntomas del sarampión incluyen los siguientes:



Fiebre alta
(puede subir hasta más de 104 °F)



Tos



Moqueo



Ojos rojos y/o llorosos



Sarpullido
(aparece de 3 a 5 días después del inicio de los síntomas)

El sarampión puede ser grave.

El sarampión puede causar complicaciones graves de salud, como neumonía, inflamación del cerebro (encefalitis) e incluso la muerte.



1 de cada 5 personas que contraen sarampión será hospitalizada.



1 de cada 20 niños con sarampión contraerá neumonía, la causa más frecuente de muerte por sarampión en niños pequeños.



1 de cada 1000 personas con sarampión presentará inflamación del cerebro por la infección (encefalitis), lo cual puede causar daño cerebral.



De 1 a 3 de cada 1000 personas con sarampión morirán.

Complicaciones a largo plazo

Una enfermedad muy rara, pero mortal, llamada panencefalitis esclerosante subaguda, puede desarrollarse de 7 a 10 años después de que una persona se haya recuperado del sarampión.



Usted tiene el poder de proteger a su hijo.

Dele a su hijo una protección segura y duradera contra el sarampión al asegurarse de que reciba la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR, por sus siglas en español). Consulte con su profesional de la salud.



www.cdc.gov/measles