


El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es una grave amenaza para la salud en las comunidades latinas, que tienen una parte desproporcionada de la carga del VIH en los Estados Unidos. Los factores que impulsan la epidemia del VIH en esta población son tan diversos como las mismas comunidades latinas. De 2005 a 2010, los esfuerzos de prevención llevaron a disminuciones prometedoras en los nuevos diagnósticos entre los latinos. Sin embargo, dado que estas disminuciones se detuvieron en los últimos años, se refuerza la necesidad de ampliar el acceso a programas de prevención del VIH para esta población importante.


Instantánea

- En 2015, aproximadamente 9,290 latinos recibieron un diagnóstico de infección por el VIH.¹
- Los latinos representan aproximadamente el 17 por ciento de la población de los EE. UU., pero representan aproximadamente el 21 por ciento de las personas que viven con el VIH (263,900 personas en 2013) y aproximadamente el 24 por ciento de todas las personas recientemente diagnosticadas con la infección.
- Los hombres representan el 88 por ciento de los diagnósticos entre los latinos.
- La tasa de diagnósticos del VIH entre los hombres latinos es más de tres veces mayor que entre los hombres blancos.
 - El 75 por ciento de los diagnósticos nuevos entre los hombres latinos se producen entre hombres que tienen sexo con hombres (HSH).²
 - Aunque los nuevos diagnósticos del VIH entre la totalidad de HSH se estabilizaron entre 2010 y 2014, los diagnósticos entre los HSH latinos aumentaron en un 13 por ciento durante ese período.
- En 2015, la tasa de diagnósticos del VIH entre las mujeres hispanas fue más de tres veces mayor que la de las mujeres blancas.
- Si continúan las tasas actuales, aproximadamente uno de cada 48 hombres latinos, una de cada 227 mujeres latinas y uno de cada cuatro hombres latinos homosexuales y bisexuales recibirán un diagnóstico del VIH durante su vida, de acuerdo con las proyecciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).

Diagnósticos del VIH entre los hispanos, en 2015, por categoría de transmisión



Tasa de diagnósticos del VIH, en 2015, por sexo y raza/origen étnico



¹ Los datos de 2015 se consideran preliminares (sujetos a cambios) debido a que están basados solo en un retraso de informe de 6 meses.

² El término hombres que tienen sexo con hombres se utiliza en los sistemas de vigilancia de los CDC. Este indica las conductas que transmiten la infección por el VIH, más que cómo se autoidentifican las personas en cuanto a su sexualidad.

- Existen diferencias regionales considerables en la carga del VIH entre los latinos en los Estados Unidos. Por ejemplo:
 - La tasa de diagnósticos del VIH es más alta entre los latinos del noreste.
 - Aunque el contacto sexual entre hombres es el modo predominante de transmisión entre todos los latinos con un diagnóstico reciente del VIH, los latinos del noreste tienen más probabilidades de infectarse por el uso de drogas intravenosas que los de otras regiones.
 - Los latinos del sur con un diagnóstico del VIH tienen más probabilidades de infectarse por el contacto sexual entre hombres que los del norte.
- El SIDA continúa cobrándose las vidas de muchos hombres y mujeres latinos. Desde el comienzo de la epidemia, han muerto más de 100,000 latinos con SIDA.
- El tratamiento del VIH ayuda a las personas con este virus a llevar vidas saludables y previene la transmisión del virus a sus parejas. Sin embargo, muy pocos latinos que viven con el VIH reciben la atención y el tratamiento que necesitan. Los CDC estiman que, de los aproximadamente 263,900 latinos que vivían con el VIH en 2013, el 85 por ciento conocía su estado. Además, un estudio reciente de los CDC sugiere que, entre los latinos que recibieron un diagnóstico del VIH, el 54 por ciento logró la supresión viral (es decir, el virus está controlado a un nivel que ayuda a la persona a mantenerse sana y reduce el riesgo de transmisión).

Factores complejos aumentan el riesgo

- **Alta prevalencia de enfermedades de transmisión sexual (ETS) y tasas del VIH más altas:** los datos muestran que la carga de las ETS entre los latinos es alta. Dado que las ETS pueden poner a una persona en un riesgo mayor de contraer una infección por el VIH, la alta prevalencia de ETS puede contribuir a una incidencia del VIH mayor entre las mujeres y los hombres latinos. Además, las tasas desproporcionadas del VIH entre los latinos y la alta prevalencia actual del VIH en las comunidades latinas aumentan las probabilidades de que los latinos encuentren una pareja sexual o un compañero con el que usa drogas inyectables infectados por el VIH, lo que implica un riesgo mayor para ellos.
- **Factores sociales y económicos:** las realidades sociales y económicas de la vida de algunos latinos, incluidas la pobreza, la discriminación y la falta de acceso a la atención médica, pueden aumentar el riesgo del VIH. Las barreras idiomáticas también pueden afectar la calidad de la atención.
- **Estigma:** el estigma relacionado con el VIH y la homosexualidad puede contribuir a diseminar el VIH en las comunidades latinas. En algunas comunidades, el valor cultural del machismo puede generar reticencia a reconocer conductas sensibles y a la vez riesgosas, como el contacto sexual entre hombres y el abuso de sustancias. El miedo a revelar una conducta de riesgo o una orientación sexual puede hacer que los latinos no se sometan a análisis ni busquen servicios de tratamiento y prevención, y el apoyo de familiares y amigos. En consecuencia, muchos latinos carecen de información crucial sobre cómo prevenir la infección.
- **Factores culturales:** la cultura latina de los Estados Unidos es diversa. Las investigaciones muestran que los latinos nacidos en diferentes países tienen distintos factores de riesgo conductual con respecto al VIH. Por ejemplo, los datos sugieren que los hispanos nacidos en Puerto Rico tienen más probabilidades que otros hispanos de contraer el VIH mediante el uso de drogas inyectables o por un contacto heterosexual de alto riesgo. Por otro lado, el contacto sexual con otros hombres es la causa principal de infección por el VIH entre los hombres nacidos en lugares como México y los 50 estados de EE. UU.

Si es miembro de algún medio de comunicación y necesita más información, visite www.cdc.gov/nchhstp/Newsroom o comuníquese con la línea para medios de comunicación del Centro Nacional para la Prevención de VIH/SIDA, Hepatitis Virales, ETS y Tuberculosis de los CDC: 404-639-8895 o NCHHSTPMediaTeam@cdc.gov.