



Gusano barrenador del Nuevo Mundo

Lo que debe saber

El gusano barrenador del Nuevo Mundo es una especie de mosca parásita que se alimenta de la carne de animales de sangre caliente y de personas. Las moscas del gusano barrenador del Nuevo Mundo ponen huevos en heridas u otros orificios del cuerpo. Los huevos eclosionan y se convierten en larvas que se alimentan de tejidos vivos, provocando una herida que empeora y que, a menudo, es dolorosa y de olor repugnante.

Signos y síntomas

- Sentir que se mueven o ver larvas en una herida o una llaga de la piel o en los oídos, la nariz, los ojos, la boca o los genitales.
- Heridas o llagas dolorosas en la piel que empeoran en pocos días.
- Olor repugnante en el lugar de la infestación.
- Sangrado en llagas abiertas.

Las heridas causadas por las larvas del gusano barrenador del Nuevo Mundo también podrían infectarse con bacterias, lo cual puede provocar síntomas como fiebre o escalofríos.

Factores de riesgo

Es más probable que usted se vea afectado por el gusano barrenador del Nuevo Mundo si se encuentra en regiones donde están sus moscas y, además:

- Pasa mucho tiempo al aire libre durante el día, especialmente si está durmiendo, si no puede mantener alejadas a las moscas o si se encuentra cerca de animales de sangre caliente.
- Tiene heridas abiertas o llagas, por pequeñas que sean.

Prevenga el gusano barrenador del Nuevo Mundo

Si se encuentra en una zona donde hay moscas del gusano barrenador del Nuevo Mundo:

- Mantenga limpias y cubiertas las heridas abiertas, sin importar cuán pequeñas sean ni en qué lugar del cuerpo se encuentren.
- Duerma en interiores con las ventanas cerradas o con malla o tela metálica. Si está al aire libre, duerma bajo un mosquitero para cama o en una carpa con malla o tela metálica.
- Proteja su piel de las picaduras de insecto de las siguientes maneras:



- » Use un [repelente de insectos registrado en la EPA](#).
- » Trate su ropa y demás artículos con permetrina al 0.05 %.
- » Use ropa holgada que limite la exposición de la piel.

Cómo se propaga

Las infestaciones por el gusano barrenador del Nuevo Mundo comienzan cuando una mosca hembra pone huevos en heridas abiertas u otras partes del cuerpo en animales de sangre caliente vivos. La mayoría de las infestaciones ocurren en animales, como el ganado, las mascotas o los animales silvestres, pero también se presentan en las personas. Los huevos eclosionan y se convierten en larvas que se introducen en la carne viva y se alimentan de ella. Tras alimentarse durante unos 7 días, las larvas caen al suelo, se meten en la tierra y luego emergen como moscas adultas del gusano barrenador del Nuevo Mundo.

Gusano barrenador del Nuevo Mundo

Tratamiento

- Si ve o siente larvas dentro o sobre una herida u otra área del cuerpo, comuníquese de inmediato con su proveedor de atención médica. Dígale si ha viajado recientemente a Centroamérica o Sudamérica, el Caribe o México.
- El proveedor de atención médica deberá extraer cada larva, a veces por medio de una operación.
- No trate de quitar las larvas o las masas de huevos usted mismo. Si algunas caen fuera de la herida, colóquelas en un recipiente hermético con alcohol para fricciones para matarlas. Llévelas a su cita con el proveedor de atención médica.

El gusano barrenador del Nuevo Mundo en animales

Si ve larvas en cualquier animal, ya sea ganado, mascotas o animales silvestres, póngase en contacto con un veterinario. Visite screwworm.gov para obtener más información sobre el gusano barrenador del Nuevo Mundo en animales.

Prevenga la propagación

No arroje larvas vivas a la basura ni las deposite afuera, ya que eso podría hacer que el gusano barrenador del Nuevo Mundo se propague en su área.



Gusano barrenador del Nuevo Mundo (izquierda) junto a una moneda de 5 centavos para comparar el tamaño. Imagen cortesía de Mark Fox, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.



Las moscas del gusano barrenador del Nuevo Mundo tienen ojos anaranjados, cuerpo de color azul o verde metálico y tres franjas más oscuras a lo largo del dorso. Imagen cortesía de Denise Bonilla, Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.



Infestación por el gusano barrenador del Nuevo Mundo en la pierna de un paciente. Imagen cortesía de [Dr Isaac Bogoch, Toronto General Hospital](#).

Infórmese más
www.cdc.gov/new-world-screwworm/es/about

