

如何防範針刺傷及尖銳物刺傷

在任何醫護場所，被針刺及其他尖銳物品所傷均屬於嚴重危害。護工在接觸受污染的針頭、手術刀、碎玻璃及其他尖銳物時，可能會沾染含有可致重大或潛在致命風險之病原體的血液。

引發潛在性針刺傷的活動

在從事以下活動時，家庭護工面臨針刺傷或尖銳物刺傷的風險：

- 處理必須在使用後予以拆卸或操作的針頭。
- 丟棄與針管相連的針頭。
- 在客戶身上操作針頭。
- 為針頭重新蓋上蓋子。
- 使用針頭或玻璃器皿在容器間轉移體液。
- 沒有將用過的針頭棄入防穿刺的尖銳物容器內。
- 沒有合適的工作台進行使用尖銳物的程序。
- 操作速度過快。
- 撞上針頭、尖銳物或兩人相撞、其中一人手持尖銳物。

僱主應當：

- 制定符合 OSHA 血源性病原體標準 (<http://www.osha.gov/SLTC/bloodbornepathogens/index.html>) 所有要求的血源性病原體控制計劃。
- 若有其他的安全有效方法，不要使用針頭裝置。
- 提供具有安全性能的針頭裝置。
- 為護工提供便於攜帶到客戶家裡的尖銳物容器。
- 調查所有與尖銳物相關的傷害。
- 提供接觸後醫療評估。

僱員應當：

- 若有其他的安全有效方法，避免使用針頭。
- 避免翻新或彎曲可能已被污染的針頭。



- 攜帶有標準型標籤的防漏防穿刺型尖銳物容器前往客戶家裡。不要僥倖認為客戶家裡會提供此類容器。從速將可能已被污染的使用過針頭裝置及尖銳物棄入容器內。
- 在使用前規劃好針頭的安全使用及丟棄。
- 將尖銳物容器放置到遠離兒童、寵物或別人不需要接觸的地方。
- 確保運輸途中使用過的尖銳物容器不會發生滲漏。
- 堅持遵守標準的預防措施、預防感染措施及一般的衛生慣例。
- 參加僱主的血源性病原體培訓計劃。
- 幫助僱主挑選及評估具有安全性能的裝置。
- 使用僱主提供的具有安全性能的裝置。
- 從速向僱主上報任何針刺傷及其他尖銳物刺傷。

若在工作過程中發生針刺傷或尖銳物刺傷或者沾染客戶的血液或其他體液，請立即按以下步驟進行處理：

- 用肥皂和清水清洗針刺及割傷傷口。
- 用水沖洗鼻子、嘴巴或皮膚上噴濺體液的地方。
- 用清水、鹽水或消毒沖洗液沖洗眼睛。
- 向主管上報事故。
- 立即尋求醫學治療。

這是六張便覽卡系列中的一張，旨在為家庭護工提供實用建議，根據《NIOSH 危害評論：家庭照護的職業危害》(NIOSH Pub No. 2010-125) 編寫。

電話：1-800-CDC-INFO | 聽障專線：1-888-232-6348

電郵：cdcinfo@cdc.gov | 網址：www.cdc.gov/niosh/topics/healthcare

DHHS (NIOSH) Publication No. 2012-123 (Chi2012)

2012 年 2 月

SAFER - HEALTHIER - PEOPLE™