

Conozca los signos de una sobredosis de opioides

Sepa cómo puede obtener ayuda

CDC Rx AWARENESS CAMPAIGN

(Campana de los CDC para crear conciencia sobre los opioides recetados)



Si cree que una persona está teniendo una sobredosis, siga estos pasos:

- Llame al 911 inmediatamente.
- Administre la naloxona, si está disponible.
- Trate de mantener a la persona despierta y respirando.
- Acueste a la persona hacia un lado para evitar la asfixia.
- Quédese con la persona hasta que lleguen los oficiales de emergencia.

Visite [cdc.gov/RxAwareness/Prevent](https://www.cdc.gov/RxAwareness/Prevent) (en inglés) para aprender cómo la naloxona puede revertir los efectos de una sobredosis de opioides cuando se administra a tiempo.

¿Cuáles son los signos de una sobredosis de opioides?

- Pupilas contraídas y pequeñas (pupilas puntiformes)
- Respiración lenta y superficial o sin respiración
- Sonidos fuertes como ronquidos, asfixia o gorgoteo
- Cuerpo sin vida
- No responder o perder el conocimiento
- Piel pálida, azulada o fría

Para aprender más, llame a la línea nacional de ayuda de SAMHSA al **1-800-662-4357** o visite [cdc.gov/RxAwareness/Treatment](https://www.cdc.gov/RxAwareness/Treatment) (en inglés).