

Factores de riesgo y síntomas

Las pruebas de detección de cáncer colorrectal salvan vidas

Factores de riesgo

Las personas con alto riesgo de cáncer colorrectal pueden necesitar pruebas de detección más frecuentemente y más temprano en su vida que otras personas.

Usted podría tener un mayor riesgo si:

- Usted o un pariente cercano ha tenido pólipos colorrectales o cáncer colorrectal.
- Usted tiene enfermedad inflamatoria intestinal.
- Usted tiene algún síndrome genético, por ejemplo poliposis adenomatosa familiar (PAF) o cáncer colorrectal hereditario no polipósico (también conocido como Síndrome de Lynch).

Hacerse las pruebas de detección para el cáncer colorrectal según las recomendaciones puede reducir su riesgo de presentar esta enfermedad. Las pruebas de detección encuentran pólipos precancerosos para que puedan ser removidos antes de que se conviertan en cáncer. Hable con su médico sobre las pruebas de detección.

Síntomas

No espere a tener síntomas para hacerse las pruebas de detección de cáncer colorrectal. Los pólipos precancerosos y el cáncer colorrectal en sus primeras etapas no siempre presentan síntomas.

Pero si hay síntomas, estos pueden incluir:

- Sangre en la materia fecal.
- Dolor de estómago o cólicos persistentes.
- Pérdida de peso sin razón conocida.

Estos síntomas también se pueden asociar a otros problemas de salud. Si usted tiene alguno de estos síntomas, hable con su médico. Sólo su médico puede determinar la causa.

Para obtener más información, llame al **1-800-CDC-INFO**
(1-800-232-4636 — oprima 2 para español) o visite
www.cdc.gov/spanish/cancer/colorectal/sfl

