Preguntas para hacerle a su médico

¿Debo hacerme una prueba de detección para el cáncer colorrectal?

- ¿Qué prueba(s) de detección es/son recomendable(s) para mí?

- ¿Cómo me preparo para la prueba?
¿Debo cambiar mi dieta o mi régimen habitual de medicamentos?

- ¿De qué consiste la prueba? ¿Será molesta o dolorosa? ¿Implica algún riesgo? ¿Cuándo obtendré los resultados y quién me los dará?

- Si le hacen una colonoscopia o sigmoidoscopia, querrá saber: ¿Quién realizará la prueba? ¿Necesitaré que alguien me acompañe?

Si su riesgo es mayor de lo normal: Algunas personas corren mayor riesgo porque tienen enfermedad inflamatoria intestinal, antecedentes personales o familiares de pólipos colorrectales o cáncer colorrectal, o algún síndrome genético, como por ejemplo poliposis adenomatosa familiar (PAF) o cáncer colorrectal hereditario no polipósico (también conocido como Síndrome de Lynch). Estas personas deberían comenzar a hacerse las pruebas de detección antes de los 50 años. Si piensa que su riesgo es mayor de lo normal, pregúntele a su médico si debería comenzar a hacerse las pruebas de detección antes de los 50 años.

Si tiene síntomas: Hable con su médico si tiene cualquiera de estos síntomas:

- Sangre en la materia fecal.
- Dolor de estómago o cólicos persistentes.
- Pérdida de peso sin razón conocida.

Estos síntomas podrían ser provocados por algún otro trastorno que no es cáncer, pero la única manera de saberlo es hablando con su médico.