

Datos Básicos

Las pruebas de detección del cáncer colorrectal salvan vidas

- Entre los tipos de cáncer que afectan tanto a los hombres como a las mujeres, el cáncer colorrectal es la segunda causa de muerte por cáncer en los Estados Unidos.
- El riesgo aumenta con la edad. Más del 90 por ciento de los casos del cáncer colorrectal ocurren en personas de 50 años de edad o más.
- Se recomienda que los hombres y las mujeres entre las edades de 50 y 75 años se hagan las pruebas para detectar la enfermedad. Si tiene más de 75 años, pregúntele a su médico si se debe hacer las pruebas.
- Esta enfermedad se puede prevenir al hacerse las pruebas. Las pruebas para detectar el cáncer colorrectal ayudan a encontrar pólipos precancerosos para que puedan ser eliminados antes de que se conviertan en cáncer.
- Las pruebas también pueden detectar el cáncer colorrectal en su etapa temprana, cuando el tratamiento es más eficaz. Aproximadamente el 90 por ciento de las personas diagnosticadas con cáncer en su etapa temprana viven 5 años o más.
- Usted corre mayor riesgo de padecer del cáncer colorrectal si:
 - usted o un familiar cercano ha tenido pólipos colorrectales o cáncer colorrectal;
 - usted tiene una enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa; o
 - usted tiene un síndrome de origen genético, como poliposis adenomatosa familiar (FAP, por sus siglas en inglés) o cáncer colorrectal hereditario no poliposo (síndrome de Lynch).

Si usted cumple con alguna de estas condiciones, pregúntele a su médico si debe comenzar a realizarse las pruebas para detectar el cáncer colorrectal antes de tener 50 años de edad y con cuánta frecuencia se debe hacer las pruebas.

Para obtener más información, llame al **1-800-CDC-INFO**
(1-800-232-4636—opríma 2 para español) o visite
www.cdc.gov/spanish/cancer/colorectal/sfl.

