

# Resumen del artículo: Informe Anual a la Nación sobre el Estado del Cáncer, 1975–2007

---

Revisado el 28 de junio de 2012 • Modificado el 31 de marzo de 2011 • Archivado el 27 de mayo de 2015

En los Estados Unidos, las tasas de mortalidad por todos los tipos de cáncer en hombres y mujeres siguieron bajando entre el 2003 y el 2007, el periodo más reciente del que se dispone información. Los hallazgos provienen del último "Informe Anual a la Nación sobre el Estado del Cáncer", realizado en colaboración por investigadores de la Asociación Norteamericana de Registros Centrales de Cáncer, el Instituto Nacional del Cáncer (que es parte de los Institutos Nacionales de Salud), los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la Sociedad Americana del Cáncer.

## Puntos destacados del informe

- Las tasas de mortalidad (o sea, la cantidad de personas que mueren de cáncer por cada 100,000 personas) del cáncer de pulmón disminuyeron por primera vez en las mujeres, más de una década después de que estas tasas comenzaron a bajar en los hombres.
- Las tasas de incidencia (o sea, la cantidad de personas con cáncer por cada 100,000 personas) de todos los tipos de cáncer combinados bajaron, en promedio, un poco menos del 1% por año entre el 2003 y el 2007.
- Las muertes por cáncer continuaron disminuyendo de manera constante desde el comienzo de la década de 1990 en hombres y mujeres.
- Las tasas de incidencia de cánceres infantiles continuaron en leve aumento, pero disminuyeron las tasas de mortalidad en este grupo etario (desde el nacimiento hasta los 19 años).
- En la sección del Artículo especial del informe, los autores destacaron que los tumores no malignos representan dos tercios del total de tumores cerebrales en adultos y un tercio de los tumores cerebrales en niños.

## Cáncer en los hombres, 2003–2007

- Las tasas de incidencia bajaron en los cánceres de pulmón, boca y garganta, estómago, cerebro (solo los malignos) y colorrectal.
- Las tasas de incidencia aumentaron en los cánceres de riñón, páncreas e hígado y en el melanoma cutáneo.
- Los hombres de raza negra presentaron las tasas de incidencia y mortalidad más elevadas.

## Cáncer en las mujeres, 2003–2007

- Las tasas de incidencia bajaron en los cánceres de mama, pulmón, útero, cuello del útero, vejiga, boca y colorrectal.
- Las tasas de incidencia aumentaron en los cánceres de riñón, páncreas y tiroides, leucemia y en el melanoma cutáneo.
- Las mujeres de raza blanca presentaron las tasas de incidencia de cáncer más elevadas; pero las mujeres de raza negra presentaron las tasas de mortalidad por cáncer más elevadas.

## Enlace relacionado

[Comunicado de prensa](#)