

患者信息

针对潜伏性结核 (TB) 感染的 12 剂量疗法



您已被确诊患有潜伏性 TB 感染。

要治疗您的潜伏性 TB 感染, 需要服用两种药物: 利福喷汀和异烟肼, 每周一次, 持续服用 12 周。服用您的全部药物非常重要。如果您本周忘记服药, 请立即致电医生或诊所。

此 12 剂量疗法不推荐 2 岁以下儿童、孕妇、治疗期间备孕女性或使用抗 HIV 药物人士使用。



什么是潜伏性 TB 感染?

“TB”是结核病的缩写。TB 在人与人之间通过空气传播。感染了 TB 病菌, 但并未感受到症状的情况称之为潜伏性 TB 感染。患者并未感受到症状是因为这种 TB 病菌在他们体内是潜伏性的, 或者说是不活跃(休眠)。潜伏性 TB 感染患者没有症状, 也不会将 TB 病菌传染给他人。



为什么要治疗潜伏性 TB 感染?

- 潜伏性 TB 感染患者可能在感染数年后才出现症状。
- 要杀死体内的 TB 病菌, 服用 TB 药物是唯一的方法。
- 服用治疗潜伏性 TB 感染的药物能防止您在未来发病。



您需要服用 12 周的药物是什么?

您将会服用两种药物: 利福喷汀和异烟肼, 每周一次, 持续服用十二周。您的医生可能会安排您从医疗人员处获取药品, 或告诉您自行取药。

其中一种药物——异烟肼, 可能会造成您手脚的麻刺感或麻木感。医生可能会在您的治疗计划中添加维生素 B6 来防止此种情况出现。

在实施治疗计划之前, 如果您有服用任何其它药物, 包括避孕药和抗 HIV 药物, 请告知医生。异烟肼和利福喷汀会与特定药物相互作用, 所以让您的医生了解您正在服用的药物非常重要。

若您于其他医生处就诊, 请务必告知医生您正在治疗潜伏性 TB 感染。




Centers for Disease
Control and Prevention
National Center for HIV/AIDS,
Viral Hepatitis, STD, and
TB Prevention

www.cdc.gov/tb

患者信息


针对潜伏性结核 (TB) 感染的 12 剂量疗法

服用 TB 药物时, 遵循医生或护士的指导很重要。



好好吃药: 每次服药都很重要

- 把服药固定在某一天的某个时间段。使用以下诀窍来帮助您记牢:
 - 使用服药记录或日历来核对您吃药的天数。
 - 在该吃药的时间设闹钟。
 - 给自己写个提醒吃药的便笺, 并且把它贴到您能注意到的地方, 比如卧室镜子或冰箱上。
 - 叫家人或朋友帮忙记住。
- 饭后服药。饭后服用潜伏性 TB 感染药物帮助身体更好吸收药物。
- 您需要一次性 (在 5-10 分钟内) 服下所有药丸。



放好药丸

- 将药品放置在室温条件下。
- 服用时才将利福喷汀药丸从罩板包装中取出。
- 将药物放在孩子接触不到的地方。
- 将药物放在不会丢失的地方。



限制酒精摄入

- 服用异烟肼时摄入酒精会使肝脏受损的风险变大。
- 您在开始服药前应 与医生讨论饮酒问题。



副作用

- 若您的尿液、唾液、眼泪或汗液变成橘红色, 这很正常。
- 异烟肼可能会造成您手脚的麻刺感或麻木感。医生可能会在您的治疗计划中添加维生素 B6 来防止此种情况出现。
- 阅读征象与症状清单, 了解您的身体无法耐受治疗时可能出现的情况。
- 不同个人对药物的反应不尽相同。若在治疗中发生任何不良反应, 请停止服药并立即致电医生或护士。



妇女服药须知

- 该药物可能会干扰激素类避孕手段 (包括避孕药、节育环和避孕针)。
- 治疗期间, 应使用非激素的物理屏障方式 (避孕套或子宫帽) 来进行避孕。
- 若您怀孕, 请停止服药并联系您的医生或护士。



Centers for Disease
Control and Prevention
National Center for HIV/AIDS,
Viral Hepatitis, STD, and
TB Prevention

www.cdc.gov/tb