

Tại sao tôi cần thử nghiệm Lao Phổi Không Hoạt Động?

Lao Phổi, hay bệnh Lao Phổi rất dễ lây lan và có khả năng gây tử vong. Vi khuẩn lao phổi có thể sống trong cơ thể nhiều năm mà không có triệu chứng gì. Đây gọi là Lao Phổi không hoạt động hay Nhiễm Lao tiềm ẩn. Nếu không được chữa trị, Lao Phổi không hoạt động có thể chuyển sang bệnh Lao Phổi bất kỳ lúc nào khiến quý vị trở bệnh. Khi chuyển thành bệnh Lao Phổi, vi khuẩn có thể lây lan theo đường không khí. **Thử nghiệm và chữa trị Lao Phổi không hoạt động có thể giúp bảo vệ bản thân quý vị, gia đình, bạn bè, và cộng đồng.**


1 Suy nghĩ Liệu tôi có nguy cơ bị nhiễm Lao Phổi?

Hàng triệu người tại Hoa Kỳ nhiễm Lao Phổi không hoạt động nhưng không hề hay biết.

Ai cũng có thể nhiễm Lao Phổi, nhưng có thể có nguy cơ cao hơn nếu quý vị:



sinh ra hoặc thường xuyên đi đến các quốc gia có nhiều người mắc bệnh lao phổi, gồm có các quốc gia tại Á Châu, Phi Châu, và Mỹ La-tinh



gần đây có tiếp xúc với người nhiễm bệnh lao phổi

có hệ miễn dịch yếu vì một số loại thuốc hoặc các bệnh nhất định, như bệnh tiểu đường, ung thư, và HIV

đang hoặc đã sống trong các khu tập thể nơi bệnh lao phổi thường xuyên xảy ra, ví dụ như nhà cho người vô gia cư, hoặc nhà tù


làm việc tại những nơi có nguy cơ lây nhiễm lao phổi cao, như nhà cho người vô gia cư, trung tâm cải huấn, và nhà dưỡng lão

Quý vị vẫn có thể bị nhiễm Lao Phổi dù đã tiêm vắc-xin ngừa Lao Phổi (còn được gọi là vắc-xin BCG) vì vắc-xin giảm tác dụng theo thời gian.

2 Thử nghiệm

Làm cách nào để thử nghiệm Lao Phổi?

Hiện có 2 cách để thử nghiệm nhiễm khuẩn lao. Tham khảo với bác sĩ của quý vị để được tư vấn loại thử nghiệm phù hợp nhất.



Thử Nghiệm Lao Phổi qua Máu

Bác sĩ của quý vị có thể khuyên quý vị thử nghiệm qua máu do việc này có thể hoàn thành trong một lần, và tính chính xác cao hơn nếu quý vị đã từng tiêm vắc-xin Lao Phổi. Thử nghiệm máu đo lường cách hệ thống miễn dịch của quý vị phản ứng với vi khuẩn gây Lao Phổi.



Thử Nghiệm Lao Phổi qua Da

Với thử nghiệm qua da, một kim tiêm nhỏ sẽ được sử dụng để đưa các chất thử nghiệm vào dưới da. Quý vị sẽ cần quay trở lại gặp bác sĩ trong 2-3 ngày để kiểm tra phản ứng.

3 Chữa trị

Hiện có những phương pháp chữa trị nào?

Nếu quý vị nhiễm Lao Phổi không hoạt động, hiện đã có các phương pháp chữa trị nhanh và tiện lợi có thể bảo vệ ngăn ngừa quý vị không trở bệnh tránh chuyển thành bệnh Lao Phổi hoạt động.

Chữa trị Lao Phổi không hoạt động là cách tốt nhất để bảo vệ ngăn ngừa quý vị không chuyển bệnh Lao Phổi. Hãy tham khảo với bác sĩ của quý vị về thuốc và các hỗ trợ cộng đồng trong thời gian chữa trị.



Các chương trình chăm sóc sức khỏe công và tư có thể đài thọ chi phí xét nghiệm và điều trị nhiễm Lao Phổi.



Để tìm hiểu thêm về bệnh Lao Phổi và cách để bảo vệ bản thân và người khác, xin vào www.cdc.gov/thinktesttreattb