

Brote de la enfermedad del Ébola en ÁFRICA OCCIDENTAL



Primer brote de la enfermedad del Ébola en África Occidental

4 países:

- Guinea
- Sierra Leona
- Liberia
- Nigeria



Posible hospedador = murciélagos

La enfermedad del Ébola es mortal en el

55-60 %

de los casos notificados en este brote.

¿Cómo se contrae el virus del Ébola?

A través del contacto directo con:

- 1 Líquidos corporales de una persona que tiene la enfermedad del Ébola o que ha muerto por ella** (sangre, vómito, orina, heces, sudor, semen, saliva y otros líquidos).
- 2 Objetos contaminados con el virus** (agujas, equipos médicos).
- 3 Animales infectados** (por el contacto con sangre o líquidos, o carne infectada).

Síntomas iniciales:

La enfermedad del Ébola solo se contagia después de que empiezan los síntomas. Los síntomas pueden aparecer entre 2 y 21 días después de la exposición.

- Fiebre
- Dolor de cabeza
- Diarrea
- Vómitos
- Dolor de estómago
- Sangrado o moretones sin causa aparente
- Dolores musculares

¿Cuándo puede alguien contagiar la enfermedad a otras personas?

El virus del Ébola solo es contagioso cuando las personas están enfermas.

La persona debe tener síntomas para contagiar la enfermedad a otras.



Si después de 21 días, la persona expuesta no tiene síntomas, no se enfermará por el virus del Ébola.

MES						
D	L	M	M	J	V	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		



U.S. Department of Health and Human Services
Centers for Disease Control and Prevention

CS250531
MLS250711