

致力於控制傳播登革熱、基孔肯亞病毒和茲卡病毒的蚊子

BZZZZ



帶有病毒的雌蚊（埃及伊蚊或白紋伊蚊）叮咬時，除了會令人發癢和不舒服之外，還可能傳播登革熱、基孔肯亞病毒或茲卡病毒。被帶有病毒的蚊子叮咬後，有可能會感染登革熱、基孔肯亞病毒或茲卡病毒。

- 雌蚊會在裝水的容器壁上產下數百個蚊卵。蚊卵會如膠般緊緊附在容器壁上，除非被刷洗掉，否則會一直附在上面。當水覆蓋著蚊卵時，大約一週蚊卵即會孵化為成蟲。
- 成蚊存在於室內外。
- 牠們偏好在白天叮咬。
- 幾隻帶病毒的蚊子即可在社區爆發大規模疫情，讓您的家人陷入染病的風險之中。

保護自己、家人和社區免遭蚊子叮咬

1.

消除住家內外的積水：

- 每週一次將任何盛水的物品，例如輪胎、水桶、盆栽容器、玩具、小水池、觀鳥水盆、花盆或垃圾容器等，倒空並刷洗、翻面、蓋住或扔掉。檢查住家內外。
- 蓋緊裝水容器（水桶、水箱、雨水桶），如此蚊子便無法在裡面產卵。
- 對沒有蓋子的容器，使用孔洞比成蚊小的鐵絲網蓋住。

2.

如果您有化糞池，請遵循以下步驟：

- 修補裂縫或隙縫。
- 蓋住通口或排水管。使用孔洞比成蚊小的鐵絲網。

3.

將蚊子隔離在屋外：

- 使用紗窗和紗門。
- 修補紗窗門破洞。
- 有空調時使用空調。



將植物栽種在土壤中，而非水中。



小水池不用時要將水放掉。



將舊輪胎回收，或防止遭到雨水侵蝕。



排空和倒空任何積水。



每週刷洗瓶罐和容器以清除蚊蟲卵。

4.

避免遭蚊子叮咬：

- 使用在美國環境保護署（簡稱EPA）註冊並含有以下其中一種有效成分的驅蟲劑。所有EPA註冊的驅蟲劑都經過評估，以確保使用安全且驅蟲有效。

有效成分

有效成分含量越高，防蚊時間越長

DEET（待乙妥）

Picaridin（避卡納叮，又名KBR 3023；美國以外地區稱為埃卡瑞丁）

IR3535（伊默寧）

檸檬尤加利油（OLE）或para-menthane-diol（PMD）

2-undecanone（2-十一酮）



使用
EPA搜尋工具
查找適合您的驅
蟲劑*。

*以下為EPA搜尋工具網站：www.epa.gov/insect-repellents/find-insect-repellent-right-you

- 務必遵循產品標籤上的說明指示。
- 視所用產品和效用強度而定，每隔幾小時再噴灑驅蟲劑一次。
- 請勿對衣物覆蓋下的皮膚直接噴灑驅蟲劑。
- 如果同時也使用防曬油，請先塗抹防曬油後再使用驅蟲劑。
- 使用百滅寧處理衣物和用具（例如：靴子、褲子、襪子和帳篷），或購買已經用百滅寧處理過的衣物和用具。
 - 處理過的衣物經過多次洗滌後，仍然具有防蚊效果。請參閱產品資訊以瞭解防蚊效用可持續多久時間。
 - 如果您自行處理衣物，請謹慎遵循產品指示。
 - 切勿直接將處理衣物的百滅寧直接使用在皮膚上。
- 穿著長袖襯衫及長褲。



將兩桶蓋緊。



每週清空噴泉或觀鳥水盆的積水。



讓化糞池保持密封。



安裝或修補紗窗及紗門。

如需更多資訊，請瀏覽：

www.cdc.gov/dengue, www.cdc.gov/chikungunya, www.cdc.gov/zika